

# プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/1/16 15:58

プロトコール名称 THP-COP 3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫  
 診療科 内科  
 投薬日数 5日  
 休薬日数 16日  
 最大クール数 8クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2019/11/ 5 12:34  
 承認者 渡邊 哲也  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 有り  
 BUN 100mg/dl 以上 Scr 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り  
 AST 135IU/l 以上 ALT 165IU/l 以上  
 T-Bil 3mg/dl 以上

CBCの検査結果値による警告 有り  
 白血球  $20 \times 10^2 / \mu l$  以下 リンパ球 1% 以下  
 好中球  $10 \times 10^2 / \mu l$  以下 血小板  $5 \times 10^4 / \mu l$  以下  
 ヘモグロビン 8g/dl 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
注射							
Rp 01 点滴注射 30分かけて グレースロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトル) 1 袋	00:00						
Rp 02 点滴注射 2時間かけて テルモ生食500mL エンドキサン注	00:00					1 袋 750 mg/m <sup>2</sup>	
Rp 03 点滴注射 30分かけて 大塚生食注100mL *&) テラルピシン注射用20mg (40~50mg/m <sup>2</sup> )	00:00					1 瓶 40 mg/m <sup>2</sup>	
Rp 04 静脈内注射 ゆっくりと 大塚生食注20mL オンコピン注射用1mg MAX 2mg/Body	00:00					1 A 1.4 mg/m <sup>2</sup>	
Rp 05 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL	00:00					1 瓶	
							-以下余白-

コメント

参考文献