

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16

15:49

プロトコール名称 BD ①④⑧⑪ 3W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 11日

休薬日数 10日

最大クール数 無制限

心機能の確認 必須

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 7/13

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2021/ 7/13 13:43

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0~ 25 mL/min

%

G F R 0~ 25 mL/min

%

C C r 25~ 50 mL/min

%

G F R 25~ 50 mL/min

%

C C r 50~ 75 mL/min

%

G F R 50~ 75 mL/min

%

C C r 75~100 mL/min

%

G F R 75~100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 75IU/l

以上

A L T

105IU/l

以上

T-Bil 2.2mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $7.5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 8g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01	00:00			00:00			
皮下注射							
皮下注射							
带状疱疹予防のためアシクロビル投与前回と同じ部位への注射を避けて下さ							
ベルケイド投与日と翌日に							
デカドロン20mg/body内服							
ド) ベルケイド注射用 3 m g							
1.3 mg/m ²							
大塚生食注 2 0 m L							
1 A							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16

15:49

プロトコール名称 BD ①④⑧⑪ 3W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 11日

休薬日数 10日

最大クール数 無制限

心機能の確認 必須

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 7/13

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2021/ 7/13 13:43

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告 有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

A S T 75IU/l

以上

A L T

105IU/l

以上

T-Bil 2.2mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告 有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $7.5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 8g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)			
注射							
Rp 01	00:00			00:00			
皮下注射							
皮下注射							
带状疱疹予防のためアシクロビル投与前回と同じ部位への注射を避けて下さ							
ベルケイド投与日と翌日に							
デカドロン20mg/body内服							
ド) ベルケイド注射用 3 m g							
1.3 mg/m ²							
大塚生食注 2 0 m L							
1 A							
ー以下余白ー							

コメント

参考文献