

プロトコールマスター内容

1 / 5

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 C-VAD 4W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫
診療科 内科
投薬日数 23日
休薬日数 5日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分
承認日時 2019/11/ 5 12:30
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0～ 25 mL/min	%	G F R	0～ 25 mL/min	%
C C r	25～ 50 mL/min	%	G F R	25～ 50 mL/min	%
C C r	50～ 75 mL/min	%	G F R	50～ 75 mL/min	%
C C r	75～100 mL/min	%	G F R	75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上
T-Bil 3mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 中心静脈注射 30分かけて *大塚生食注100mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 6 瓶	00:00	00:00	00:00	00:00			
注射							
Rp 02 中心静脈注射 中心静脈注射 15分かけて グラネトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
注射							
Rp 03 中心静脈注射 中心静脈注射 15分かけて グラネトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 1 A					00:00		
注射							
Rp 04 中心静脈注射 中心静脈注射 ルート① 24時間かけて *テルモ生食500mL 1 袋 オンコビン注射用1mg 0.5 mg/Body	00:00	00:00	00:00	00:00			
Rp 05 中心静脈注射 中心静脈注射 ルート② オンコビンと別ルート 24時間かけて *テルモ生食500mL 1 袋 ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サント」5mL 9 mg/m ² 【冷所保存】	00:00	00:00	00:00	00:00			
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 5

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 C-VAD 4W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2019/11/ 5 12:30

承認者

渡邊 哲也

承認取消日時

承認取消者

更新者

渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告 有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

A S T 135IU/l

以上

A L T

165IU/l

以上

T-Bil 3mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告 有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 8g/dl

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 06 中心静脈注射 DAY⑤はルート②より投与 *テルモ生食500mL *エンドキサン注		中心静脈注射 2時間かけて 1 袋 600 mg/Body			00:00		
注射							
Rp 07 中心静脈注射 オンコビン後フラッシュ 大塚生食注50mL		中心静脈注射 1 瓶			00:00		
注射							
Rp 08 中心静脈注射 エンドキサン後フラッシュ用 大塚生食注50mL		中心静脈注射 1 瓶			00:00		
		続き有り					

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 5

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 C-VAD 4W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫
診療科 内科
投薬日数 23日
休薬日数 5日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分
承認日時 2019/11/ 5 12:30
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上
T-Bil 3mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 中心静脈注射 30分かけて *大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 デキサート注射液 6 . 6 mg / 2 mL (デカトロン) 6 瓶			00:00	00:00	00:00	00:00	
注射							
Rp 02 中心静脈注射 中心静脈注射 15分かけて グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋			00:00				
Rp 06 中心静脈注射 中心静脈注射 DAY⑤はルート②より投与 2時間かけて *テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋 *エンドキサン注 600 mg/Body			00:00				
Rp 08 中心静脈注射 中心静脈注射 エンドキサン後フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶			00:00				
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 5

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 C-VAD 4W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫
診療科 内科
投薬日数 23日
休薬日数 5日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分
承認日時 2019/11/ 5 12:30
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない
C C r 0～ 25 mL/min %
C C r 25～ 50 mL/min %
C C r 50～ 75 mL/min %
C C r 75～100 mL/min %

G F R 0～ 25 mL/min %
G F R 25～ 50 mL/min %
G F R 50～ 75 mL/min %
G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上
T-Bil 3mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 中心静脈注射 30分かけて *大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 デキサート注射液 6 . 6 mg / 2 mL (デカトロン) 6 瓶						00:00	00:00
注射							
Rp 02 中心静脈注射 中心静脈注射 15分かけて グラネセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋						00:00	
Rp 06 中心静脈注射 中心静脈注射 DAY⑤はルート②より投与 2時間かけて *テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋 *エンドキサン注 600 mg/Body						00:00	
Rp 08 中心静脈注射 中心静脈注射 エンドキサン後フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶						00:00	
続き有り							

コメント

参考文献

5 / 5

発行日時 2022/1/16 15:50

同一グループ

有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

渡邊 哲也

%

以上

以上

以下

以下

.....

30 日前までの検査結果を参照

デキサート注射液 6. 6 mg/ 2 mL (デカトロン)

瓶

—以下余白—

00:00

参考文献