

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 CHOP 3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
 診療科 内科
 投薬日数 5日
 休薬日数 16日
 最大クール数 8クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2019/11/ 5 12:30
 承認者 渡邊 哲也
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上	

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 135IU/l	以上	ALT 165IU/l	以上	
T-Bil 3mg/dl	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下	
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下	
ヘモグロビン 8g/dl	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
注射							
Rp 01 点滴注射 30分かけて グラーセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトル) 1 袋	00:00						
Rp 02 点滴注射 2時間かけて テルモ生食500mL エンドキサン注 750 mg/m ²	00:00						
Rp 03 点滴注射 30分かけて 大塚生食注100mL ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サント」5mL 50 mg/m ² 【冷所保存】	00:00						
Rp 04 静脈内注射 ゆっくりと 大塚生食注20mL オンコピン注射用1mg MAX 2mg/Body 1.4 mg/m ²	00:00						
Rp 05 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						
							—以下余白—

コメント

参考文献