

プロトコールマスター内容

1 / 6

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 D-VMP 導入時 ①④⑧⑪⑮⑲⑳㉓㉔㉕㉖㉗ 6W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫
診療科 内科
投薬日数 36日
休薬日数 6日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 5/ 8 有効終了日

承認区分
承認日時 2020/ 5/ 8 13:49
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%	
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%	
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%	
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
B U N 100mg/dl	以上	S c r	2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
A S T 75IU/l	以上	A L T	105IU/l	以上
T-Bil 2.2mg/dl	以上			

C B Cの検査結果値による警告	有り			
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板	$7 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 フェキソフェナジン塩酸塩錠▲60mg「SANIK」(アレグ [®]) 1 錠 カロナール錠200mg 2 錠 (10mgシガ [®]) モンテルカスト錠10mg「KM」 1 錠 ．．1日1回 ダラザレックス開始1時間前に内服	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴注射 30分かけて ダラザレックス投与1～3時間前 デキサート注射液6．6mg/2mL(デ [®] カ [®] ト [®] ン) 3 瓶 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						
注射							
Rp 03 点滴注射 点滴注射 総量1000mLに希釈 50mL/時から開始 200mL/時まで カーミパック生理食塩液1L 1000 ml ダラザレックス点滴静注 16 mg/kg 【冷所保存】	00:00						
注射							
Rp 06 皮下注射 皮下注射 帯状疱疹予防のためアシクロビル投与前回と同じ部位への注射を避けて下さ Day1～4アルケラン9mg/m ² 内服 Day2～4 PSL60mg/m ² 内服 ド) ベルケイド注射用3mg 1.3 mg/m ² 大塚生食注20mL 1 A	00:00			00:00			
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 6

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 D-VMP 導入時 ①④⑧⑪⑮⑲⑳㉓㉔㉕㉖㉗ 6W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 36日

休薬日数 6日

最大クール数 1クール

心機能の確認 必須

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2020/ 5/ 8 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2020/ 5/ 8 13:49

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告 有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

A S T 75IU/l

以上

A L T

105IU/l

以上

T-Bil 2.2mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告 有り

白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$

以下

血小板

$7 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 8g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方 (前投薬) 院内							
Rp 02 フェキソフェナール塩酸塩錠▲60mg「SANIK」(アレグ [®]) カロナール錠200mg ... 1日1回 ダラザレックス開始1時間前に内服	朝						
1錠 2錠							
注射							
Rp 01 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注100mL	00:00						
点滴注射 1瓶							
Rp 02 点滴注射 30分かけて デキサート注射液6.6mg/2mL(デカ [®] ト [®] ソ [®]) 大塚生食注50mL	00:00						
点滴注射 ダラザレックス投与1～3時間前 3瓶 1瓶							
注射							
Rp 04 点滴注射 初回に問題なければ総量500mLに希釈 テルモ生食500mL ダラザレックス点滴静注	00:00						
点滴注射 50mL/時から開始 500ml 16mg/kg 【冷所保存】							
注射							
Rp 06 皮下注射 帯状疱疹予防のためアシクロビル投与前回と同じ部位への注射を避けて下さ Day1～4アルケラン9mg/m ² 内服 ド)ベルケイド注射用3mg 大塚生食注20mL	00:00			00:00			
皮下注射 Day2～4 PSL60mg/m ² 内服 1.3mg/m ² 1A							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 D-VMP 導入時 ①④⑧⑪⑮⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺ 6W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫
診療科 内科
投薬日数 36日
休薬日数 6日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 5/ 8 有効終了日

承認区分
承認日時 2020/ 5/ 8 13:49
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%	
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%	
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%	
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
B U N 100mg/dl	以上	S c r	2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
A S T 75IU/l	以上	A L T	105IU/l	以上
T-Bil 2.2mg/dl	以上			

C B Cの検査結果値による警告	有り			
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板	$7 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方（前投薬） 院内							
Rp 03 フェキソフェナール塩酸塩錠▲60mg「SANIK」（アレグ®） 1 錠 カロナール錠200mg 2 錠 ．．1日1回 ダラザレックス開始1時間前に内服	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴注射 30分かけて ダラザレックス投与1～3時間前 デキサート注射液6．6mg/2mL（デカト®ン） 3 瓶 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						
Rp 05 点滴注射 点滴注射 2回目も問題なければ総量500mLに希釈100mL/時から開始200mL/時まで テルモ生食500mL 500 mL ダラザレックス点滴静注 16 mg/kg 【冷所保存】	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 6

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 D-VMP 導入時 ①④⑧⑪⑮⑲⑳㉓㉔㉕㉖㉗ 6W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫
診療科 内科
投薬日数 36日
休薬日数 6日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 5/ 8 有効終了日

承認区分
承認日時 2020/ 5/ 8 13:49
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%	
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%	
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%	
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
B U N 100mg/dl	以上	S c r	2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
A S T 75IU/l	以上	A L T	105IU/l	以上
T-Bil 2.2mg/dl	以上			

C B Cの検査結果値による警告	有り			
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板	$7 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
処方（前投薬） 院内							
Rp 05 フェキソフェナール塩酸塩錠▲60mg「SANIK」（アレグ [®] ラ） 1 錠 カロナール錠200mg 2 錠 ．．1日1回 ダラザレックス開始1時間前に内服	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴注射 30分かけて ダラザレックス投与1～3時間前 デキサート注射液6．6mg/2mL（デカ [®] ト [®] ン） 3 瓶 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						
Rp 05 点滴注射 点滴注射 2回目も問題なければ総量500mLに希釈100mL/時から開始200mL/時まで テルモ生食500mL 500 mL ダラザレックス点滴静注 16 mg/kg 【冷所保存】	00:00						
注射							
Rp 06 皮下注射 皮下注射 帯状疱疹予防のためアシクロビル投与前回と同じ部位への注射を避けて下さ Day1～4アルケラン9mg/m ² 内服 Day2～4 PSL60mg/m ² 内服 ド）ベルケイド注射用3mg 1.3 mg/m ² 大塚生食注20mL 1 A	00:00			00:00			
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

6 / 6

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 D-VMP 導入時 ①④⑧⑪⑮⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺ 6W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫
診療科 内科
投薬日数 36日
休薬日数 6日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 5/ 8 有効終了日

承認区分
承認日時 2020/ 5/ 8 13:49
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%	
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%	
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%	
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
B U N 100mg/dl	以上	S c r	2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
A S T 75IU/l	以上	A L T	105IU/l	以上
T-Bil 2.2mg/dl	以上			

C B Cの検査結果値による警告	有り			
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板	$7 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day (36)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 06 フェキソフェナール塩酸塩錠▲60mg「SANIK」（アレグセラ） カロナール錠200mg ... 1日1回 ダラザレックス開始1時間前に内服	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注100mL	00:00						
Rp 02 点滴注射 30分かけて デキサート注射液6.6mg/2mL（デカトロン） 大塚生食注50mL	00:00						
Rp 05 点滴注射 2回目も問題なければ総量500mLに希釈100mL/時から開始200mL/時まで テルモ生食500mL ダラザレックス点滴静注	00:00						
【冷所保存】							
ー以下余白ー							

コメント

参考文献