# プロトコールマスター内容



発行日時 2022/1/16 15:58

プロトコール名称 R-THP-COP 3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
診療科 内科
投薬日数 7日
休薬日数 14日
最大クール数 8クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2019/11/ 5 12:33
承認者 渡邉 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邉 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＣＣｒ 0～ 25 mL/min | % | ＧＦＲ 0～ 25 mL/min | % |
| ＣＣｒ 25～ 50 mL/min | % | ＧＦＲ 25～ 50 mL/min | % |
| ＣＣｒ 50～ 75 mL/min | % | ＧＦＲ 50～ 75 mL/min | % |
| ＣＣｒ 75～100 mL/min | % | ＧＦＲ 75～100 mL/min | % |

腎機能の検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＢＵＮ | 100mg/dl | 以上 | Ｓｃｒ | 2.4mg/dl | 以上 |

肝機能の検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＳＴ | 54IU/l | 以上 | ＡＬＴ | 66IU/l | 以上 |
| T-Bil | 1.5mg/dl | 以上 | | | |

ＣＢＣの検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白血球 | 30×10^2/μl | 以下 | リンパ球 | 1% | 以下 |
| 好中球 | 15×10^2/μl | 以下 | 血小板 | 7.5×10^4/μl | 以下 |
| ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ | 8g/dL | 以下 | | | |

30日前までの検査結果を参照

| | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | day(6) | day(7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処方（前投薬） 院内 | | | | | | | |
| Rp 01<br>レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 5 錠<br>後)ロキソプロフェンNa錠60mg「ｻﾜｲ」(ﾛｷｿﾆﾝ) 1 錠<br>．．1日1回<br>開始３０分前に内服 | 朝 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | |
| Rp 01<br>点滴注射 点滴注射<br>注入速度徐々にUP 前投与薬注意<br>テルモ生食５００ｍＬ 1 袋<br>10倍稀釈して下さい<br>リツキサン注 375 mg/㎡ | 00:00 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | |
| Rp 02<br>点滴注射 点滴注射<br>30分かけて PSL100mg/Body 5日間<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」(ｶｲﾄﾘﾙ) 1 袋 | | | 00:00 | | | | |
| Rp 03<br>点滴注射 点滴注射<br>2時間かけて<br>テルモ生食５００ｍＬ 1 袋<br>エンドキサン注 750 mg/㎡ | | | 00:00 | | | | |
| Rp 04<br>点滴注射 点滴注射<br>30分かけて<br>大塚生食注１００ｍＬ 1 瓶<br>＊&）テラルビシン注射用２０ｍｇ 40 mg/㎡<br>(40～50mg/㎡) | | | 00:00 | | | | |
| 続き有り | | | | | | | |

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容



発行日時 2022/1/16 15:58

プロトコール名称 R-THP-COP 3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
診療科 内科
投薬日数 7日
休薬日数 14日
最大クール数 8クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2019/11/ 5 12:33
承認者 渡邉 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邉 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＣＣｒ 0～ 25 mL/min | % | ＧＦＲ 0～ 25 mL/min | % |
| ＣＣｒ 25～ 50 mL/min | % | ＧＦＲ 25～ 50 mL/min | % |
| ＣＣｒ 50～ 75 mL/min | % | ＧＦＲ 50～ 75 mL/min | % |
| ＣＣｒ 75～100 mL/min | % | ＧＦＲ 75～100 mL/min | % |

腎機能の検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＢＵＮ | 100mg/dl | 以上 | Ｓｃｒ | 2.4mg/dl | 以上 |

肝機能の検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＳＴ | 54IU/l | 以上 | ＡＬＴ | 66IU/l | 以上 |
| T-Bil | 1.5mg/dl | 以上 | | | |

ＣＢＣの検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白血球 | 30×10^2/μl | 以下 | リンパ球 | 1% | 以下 |
| 好中球 | 15×10^2/μl | 以下 | 血小板 | 7.5×10^4/μl | 以下 |
| ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ | 8g/dL | 以下 | | | |

30日前までの検査結果を参照

| | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | day(6) | day(7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 05 | | | 00:00 | | | | |
| 静脈内注射 静脈内注射 | | | | | | | |
| ゆっくりと | | | | | | | |
| 大塚生食注２０ｍＬ 1 A | | | | | | | |
| オンコビン注射用１ｍｇ 1.4 mg/㎡ | | | | | | | |
| MAX 2mg/Body | | | | | | | |
| Rp 06 | 00:00 | | 00:00 | | | | |
| 点滴注射 点滴注射 | | | | | | | |
| フラッシュ用 | | | | | | | |
| 大塚生食注５０ｍＬ 1 瓶 | | | | | | | |
| －以下余白－ | | | | | | | |

コメント

参考文献