

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 VAD 4W

同一グループ

疾患名	造血器/多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/11/ 5 12:34
投薬日数	20日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	8日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/11/ 5	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 135IU/l	以上	ALT 165IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて *大塚生食注100mL デキサート注射液6.6mg/2mL(テカトロン) テキサメザン40mg/Body	00:00	00:00	00:00	00:00			
中心静脈注射 中心静脈注射							
1 瓶 6 瓶							
注射							
Rp 02 中心静脈注射 15分かけて グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトル)	00:00						
中心静脈注射 中心静脈注射							
1 袋							
注射							
Rp 03 中心静脈注射 ルート① *テルモ生食500mL オンコビン注射用1mg	00:00	00:00	00:00	00:00			
中心静脈注射 中心静脈注射							
24時間かけて 1 袋 0.4 mg/Body							
注射							
Rp 04 中心静脈注射 ルート② オンコビンと別ルート *テルモ生食500mL ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サント」5mL	00:00	00:00	00:00	00:00			
中心静脈注射 中心静脈注射							
24時間かけて 1 袋 9 mg/m ² 【冷所保存】							
注射							
Rp 05 中心静脈注射 オンコビン後フラッシュ用 大塚生食注50mL					00:00		
中心静脈注射 中心静脈注射							
1 瓶 続き有り							

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/1/16

15:50

プロトコル名称 VAD 4W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫
診療科 内科
投薬日数 20日
休薬日数 8日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2019/11/ 5 12:34
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り

BUN 100mg/dl 以上 Scr 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

AST 135IU/l 以上 ALT 165IU/l 以上
T-Bil 3mg/dl 以上

CBCの検査結果値による警告 有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$ 以下 血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06 静脈内注射 静脈内注射 ドキシソルピシン後フラッシュ用 大塚生食注50mL 1 瓶 続き有り					00:00		

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/1/16

15:50

プロトコール名称 VAD 4W

同一グループ

疾患名	造血器/多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/11/ 5 12:34
投薬日数	20日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	8日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/11/ 5	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 135IU/l	以上	ALT 165IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて *大塚生食注100mL デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) デキサメサゾン40mg/Body		00:00	00:00	00:00	00:00		
中心静脈注射							
1 瓶							
6 瓶							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 VAD 4W

同一グループ

疾患名	造血器/多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/11/ 5 12:34
投薬日数	20日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	8日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/11/ 5	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 135IU/l	以上	ALT 165IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)
注射						
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて *大塚生食注100mL デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) デキサメサゾン40mg/Body			00:00	00:00	00:00	00:00
中心静脈注射						
1 瓶						
6 瓶						
—以下余白—						

コメント

参考文献