

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/1/16 16:27

プロトコール名称 mLSG15①⑧⑬⑯⑰ 4W

同一グループ

疾患名 造血器/成人T細胞白血病リンパ腫
診療科 内科
投薬日数 28日
休薬日数 0日
最大クール数 6クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/11/ 4 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2020/11/ 4 08:26
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 75mg/dl 以上 S c r 1.2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 75IU/l 以上 A L T 67.5IU/l 以上
T-Bil 2.2mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 点滴注射 ルート確保用 大塚生食注100mL 点滴注射 フラッシュ用 1 瓶	00:00						
Rp 02 点滴注射 PSL 40mg/m ² 内服 大塚生食注100mL *アロキシ静注0.75mg/5mL 点滴注射 30分かけて点滴 1 瓶 1 瓶	00:00						
注射							
Rp 04 点滴注射 2時間かけて テルモ生食500mL エンドキサン注 点滴注射 1 袋 350 mg/m ²	00:00						
Rp 05 点滴注射 30分かけて 大塚生食注100mL ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サント」5mL 点滴注射 1 瓶 40 mg/m ² 【冷所保存】	00:00						
Rp 06 静脈内注射 ゆっくりと 大塚生食注20mL オンコピン注射用1mg MAX 2mg/Body 静脈内注射 1 A 1 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/1/16 16:27

プロトコール名称 mLSG15①⑧⑬⑯⑰ 4W

同一グループ

疾患名 造血器/成人T細胞白血病リンパ腫
診療科 内科
投薬日数 28日
休薬日数 0日
最大クール数 6クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/11/ 4 有効終了日

承認区分
承認日時 2020/11/ 4 08:26
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 75mg/dl 以上 S c r 1.2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 75IU/l 以上 A L T 67.5IU/l 以上
T-Bil 2.2mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 01 点滴注射 ルート確保用 大塚生食注100mL 点滴注射 フラッシュ用 1 瓶	00:00						
Rp 02 点滴注射 PSL 40mg/m ² 内服 大塚生食注100mL *アロキシ静注0.75mg/5mL 点滴注射 30分かけて点滴 1 瓶 1 瓶	00:00						
注射							
Rp 07 点滴注射 30分かけて 大塚生食注100mL ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サント」5mL 点滴注射 1 瓶 30 mg/m ² 【冷所保存】	00:00						
Rp 08 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 注射用サイメリン 点滴注射 1 袋 60 mg/m ² 【冷&暗保存】	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/1/16 16:27

プロトコール名称 mL SG15①⑧⑬⑯⑰ 4W

同一グループ

疾患名 造血器/成人T細胞白血病リンパ腫
診療科 内科
投薬日数 28日
休薬日数 0日
最大クール数 6クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/11/ 4 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2020/11/ 4 08:26
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 75mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 75IU/l	以上	A L T 67.5IU/l	以上
T-Bil 2.2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射							
Rp 01 点滴注射 ルート確保用 大塚生食注100mL	00:00						
点滴注射 フラッシュ用 1 瓶							
Rp 02 点滴注射 PSL 40mg/m ² 内服 大塚生食注100mL *アロキシ静注0.75mg/5mL	00:00						
点滴注射 30分かけて点滴 1 瓶 1 瓶							
注射							
Rp 03 点滴注射 PSL 40mg/m ² 内服 大塚生食注100mL		00:00	00:00				
点滴注射 ルート確保用 1 瓶							
注射							
Rp 09 静脈内注射 ゆっくりと 大塚生食注20mL 注射用フィルデシン	00:00						
静脈内注射 1mgあたり生食1mLの割合で溶解 1 A 2.4 mg/m ² 【冷&暗保存】							
Rp 10 点滴注射 2時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL パラプラチン注	00:00						
点滴注射 1 袋 250 mg/m ²							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/1/16 16:27

プロトコール名称 mLSG15①⑧⑬⑯⑰ 4W

同一グループ

疾患名 造血器/成人T細胞白血病リンパ腫
診療科 内科
投薬日数 28日
休薬日数 0日
最大クール数 6クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/11/ 4 有効終了日

承認区分
承認日時 2020/11/ 4 08:26
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~ 25 mL/min	%	GFR 0~ 25 mL/min	%
CCr 25~ 50 mL/min	%	GFR 25~ 50 mL/min	%
CCr 50~ 75 mL/min	%	GFR 50~ 75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
BUN 75mg/dl 以上 S c r 1.2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
AST 75IU/l 以上 ALT 67.5IU/l 以上
T-Bil 2.2mg/dl 以上

CBCの検査結果値による警告 有り
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射							
Rp 11	00:00	00:00	00:00				
点滴注射							
2時間かけて							
テルモ生食500mL							
D禁ラステット注100mg/5mL							
1 袋							
100 mg/m ²							
—以下余白—							

コメント

参考文献