

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/1/16 15:50

プロトコール名称 ダラキューロ（皮下注） ① 4W

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 1日

休薬日数 27日

最大クール数 無制限

心機能の確認 必須

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 7/ 7 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2021/ 7/ 7 09:30

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告 有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

A S T 75IU/l

以上

A L T

105IU/l

以上

T-Bil 2.2mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告 有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $7 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 8g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 01	朝						
フェキソフェナール塩酸塩錠▲60mg「SANIK」（アレグ [®] ラ）	1	錠					
カロナール錠200mg	2	錠					
．．1日1回							
ダラキューロ開始1時間前に内服							
注射							
Rp 01	00:00						
点滴注射							
ダラキューロ投与1時間前							
点滴注射							
30分かけて							
デキサート注射液6．6mg/2mL（デ [®] カ [®] ト [®] ロン）	3	瓶					
大塚生食注50mL	1	瓶					
Rp 02	00:00						
皮下注射							
3～5分かけて							
ダラキューロ配合皮下注 15mL	1	瓶/Body					
		【冷所保存】					
		ー以下余白ー					

コメント

参考文献