

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/1/16

16:25

プロトコール名称 ビダーザ注①～⑦4W

同一グループ

疾患名 造血器/MDS

診療科 内科

投薬日数 7日

休薬日数 21日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/30

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2021/ 4/30 09:01

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 135IU/l

以上

A L T

165IU/l

以上

T-Bil 3mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $3000 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $1500 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $7.5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 8g/dl

以下

0日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
点滴注射							
点滴注射							
主管、フラッシュ用							
大塚生食注50mL							
1 瓶							
Rp 02	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
点滴注射							
点滴注射							
30分かけて							
グラニセトン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトル)							
1 袋							
Rp 03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
点滴注射							
点滴注射							
投与量は適性使用ガイド参照							
溶解後1時間以内に投与終了							
10分かけて投与							
血液毒性、腎機能により減量							
ビダーザ注射用100mg							
75 mg/m ²							
大塚蒸留水20mL							
1 A							
ビダーザ1Vに対し10mLで溶解							
大塚生食注50mL							
1 瓶							
ー以下余白ー							

コメント

参考文献