

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/1/16 15:58

プロトコール名称 ガザイバ① 8W (メンテナンス)

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
診療科 内科
投薬日数 1日
休薬日数 55日
最大クール数 12クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/ 3/25 有効終了日

承認区分
承認日時 2021/ 3/25 07:51
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 135 IU/l 以上 A L T 165 IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 9 g/dl 以下

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)						
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 カロナール錠 200mg 5 錠 投与時反応発現歴に応じてレスパシ、ステロイド考 ．． 1日1回 ガザイバ開始の30～60分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 投与時反応発現歴に応じて ステロイド使用考慮 大塚生食注 50mL 1 瓶 ルート確保 フラッシュ用	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴注射 注入速度徐々にUP、降圧剤中止考慮 リンパ球↓ST合剤考慮 投与後30分経過観察 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 210 mL ガザイバ点滴静注 1000mg / 40mL 1000 mg/Body 0.2、0.22インラインフィルター 【冷&暗保存】	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献