

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 15:58

プロトコール名称 ガザイバ①+トリアキシン①②2～6クール4w

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
診療科 内科
投薬日数 2日
休薬日数 26日
最大クール数 5クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2019/11/ 5 12:35
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r	2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T	165IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1% 以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$7.5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)					
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 カロナール錠200mg 5錠 ... 1日1回 ガザイバ開始の30～60分前に内服	朝						
注射 Rp 01 点滴注射 点滴注射 主管フラッシュ用様子観察時使用 ルート確保用 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1袋	00:00						
注射 Rp 02 点滴注射 点滴注射 主管 フラッシュ用、ルート確保用 大塚生食注50mL 1瓶		00:00					
注射 Rp 03 点滴注射 点滴注射 30分かけて ガザイバ開始の60分前には終了 infusion reaction有無で ステロイド減量検討 グレースロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトル) 1袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 3瓶	00:00						
注射 Rp 04 点滴注射 点滴注射 30分かけて グレースロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトル) 1袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 1瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 1A		00:00					
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 15:58

プロトコール名称 ガザイバ①+トレアキシ①②2～6クール4w

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
診療科 内科
投薬日数 2日
休薬日数 26日
最大クール数 5クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2019/11/ 5 有効終了日

承認区分
承認日時 2019/11/ 5 12:35
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 135 IU/l 以上 A L T 165 IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 9g/dl 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)					
注射							
Rp 05 点滴注射 点滴注射 注入速度徐々にUP、降圧剤中止考慮 リンパ球↓ST合剤考慮 投与後30分経過観察 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 210 mL ガザイバ点滴静注1000mg/40mL 1000 mg/Body 0.2、0.22インラインフィルター 【冷&暗保存】	00:00						
注射							
Rp 06 点滴注射 点滴注射 60分以上かけて投与 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 全量250mLに調製 大塚蒸留水100mL 1 瓶 溶解は25mgあたりAq10mL必要 トレアキシ点滴静注用▲100mg 90 mg/m ² ー以下余白ー	00:00	00:00					

コメント

参考文献