

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/1/16

15:21

プロトコール名称 ★ドセタキセル①パージェタ①ハーセプチン① 3W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2018/10/19 13:50
投薬日数	1日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2018/10/19	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $40 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 主管です。ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 初回60分、2回目以降30分まで短縮可 側管① 投与後初回1時間2回目以降30分経過観 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L 420 mg/Body 初回は840mg、2回目以降420mg/bodyです 【冷&暗保存】	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 初回90分2回目以降30分まで短縮可 側管② 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 ハーセプチン注 6 mg/kg 初回は8mg/kg、2回目以降6mg/kgです 【冷&暗保存】	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 15分かけて 側管③ 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶 ナゼア注射液 0. 3 m g 2 m L 1 A デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 8 A (1 0 ～ 2 0 m g で使用)	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1時間かけて 側管④ 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 ド)ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 75 mg/m ²	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献