

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 15:21

プロトコール名称 ★ナベルピン①⑧ 3W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2017/ 5/ 2 09:56
投薬日数	8日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2017/ 5/ 2	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^4 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 主管です。ルート確保（少量使用）とナベルピン終了後に静脈炎予防で250ml流 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて 側管① 大塚生食注50mL 1 瓶 ナゼア注射液0.3mg 2mL 1 A デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 5 A	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 10分以内に 側管② 大塚生食注50mL 1 瓶 ナベルピン注 25 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 15:21

プロトコール名称 ★ナベルピン①⑧ 3W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2017/ 5/ 2 09:56
投薬日数	8日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2017/ 5/ 2	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^4 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (8)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 主管です。ルート確保（少量使用）とナベルピン終了後に静脈炎予防で250ml流 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて 側管① 大塚生食注50mL 1 瓶 ナゼア注射液0.3mg/2mL 1 A デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 5 A	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 10分以内に 側管② 大塚生食注50mL 1 瓶 ナベルピン注 25 mg/m ²	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献