# プロトコールマスター内容



発行日時 2022/1/16 15:21

プロトコール名称 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ①⑧⑮ｱﾊﾞｽﾁﾝ①⑮4W

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 外科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2017/ 5/ 2 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2017/ 5/ 2 10:05
承認者 渡邉 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邉 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＣＣｒ 0～ 25 mL/min | % | | ＧＦＲ 0～ 25 mL/min | % | |
| ＣＣｒ 25～ 50 mL/min | % | | ＧＦＲ 25～ 50 mL/min | % | |
| ＣＣｒ 50～ 75 mL/min | % | | ＧＦＲ 50～ 75 mL/min | % | |
| ＣＣｒ 75～100 mL/min | % | | ＧＦＲ 75～100 mL/min | % | |

腎機能の検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＢＵＮ | 25mg/dl | 以上 | Ｓｃｒ | 1.5mg/dl | 以上 |

肝機能の検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＳＴ | 54IU/l | 以上 | ＡＬＴ | 66IU/l | 以上 |
| T-Bil | 1.5mg/dl | 以上 | | | |

ＣＢＣの検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白血球 | 30×10^2/μl | 以下 | リンパ球 | 1% | 以下 |
| 好中球 | 15×10^2/μl | 以下 | 血小板 | 7.5×10^4/μl | 以下 |
| ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ | 8g/dL | 以下 | | | |

30日前までの検査結果を参照

| | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | day(6) | day(7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処方（前投薬） 院内 | | | | | | | |
| Rp 01<br>レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 5 錠<br>．．1日1回 | 朝 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | |
| Rp 01<br>中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液<br>主管 ルート確保 ｱﾊﾞｽﾁﾝﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ後ﾌﾗｯｼｭ<br>大塚生食注１００ｍＬ 1 瓶 | 00:00 | | | | | | |
| Rp 02<br>中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入<br>1時間かけて 初回は90分で投与<br>側管<br>生理食塩液バッグ「フソー」２５０ｍＬ 1 袋<br>アバスチン注 10 mg/kg | 00:00 | | | | | | |
| Rp 03<br>中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液<br>レスタミン服用 30分かけて<br>30分あけて ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ投与 側管<br>大塚生食注５０ｍＬ 1 瓶<br>デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A<br>初回のみ5A投与<br>ガスター注射液２０ｍｇ２ｍＬ 1 A | 00:00 | | | | | | |
| Rp 04<br>中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入<br>90分かけて 側管<br>生理食塩液バッグ「フソー」２５０ｍＬ 1 袋<br>パクリタキセル注 90 mg/㎡ | 00:00 | | | | | | |

続き有り

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容



発行日時 2022/1/16 15:21

プロトコール名称 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ①⑧⑮ｱﾊﾞｽﾁﾝ①⑮4W

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 外科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2017/ 5/ 2 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2017/ 5/ 2 10:05
承認者 渡邉 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邉 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＣＣｒ 0～ 25 mL/min | % | | ＧＦＲ 0～ 25 mL/min | % | |
| ＣＣｒ 25～ 50 mL/min | % | | ＧＦＲ 25～ 50 mL/min | % | |
| ＣＣｒ 50～ 75 mL/min | % | | ＧＦＲ 50～ 75 mL/min | % | |
| ＣＣｒ 75～100 mL/min | % | | ＧＦＲ 75～100 mL/min | % | |

腎機能の検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＢＵＮ | 25mg/dl | 以上 | Ｓｃｒ | 1.5mg/dl | 以上 |

肝機能の検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＳＴ | 54IU/l | 以上 | ＡＬＴ | 66IU/l | 以上 |
| T-Bil | 1.5mg/dl | 以上 | | | |

ＣＢＣの検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白血球 | 30×10^2/μl | 以下 | リンパ球 | 1% | 以下 |
| 好中球 | 15×10^2/μl | 以下 | 血小板 | 7.5×10^4/μl | 以下 |
| ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ | 8g/dL | 以下 | | | |

30日前までの検査結果を参照

| | day(8) | day(9) | day(10) | day(11) | day(12) | day(13) | day(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処方（前投薬） 院内 | | | | | | | |
| Rp 02<br>レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 5 錠<br>．．1日1回 | 朝 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | |
| Rp 01<br>中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液<br>主管 ルート確保 ｱﾊﾞｽﾁﾝﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ後ﾌﾗｯｼｭ<br>大塚生食注１００ｍＬ 1 瓶 | 00:00 | | | | | | |
| Rp 03<br>中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液<br>レスタミン服用 30分かけて<br>30分あけて ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ投与 側管<br>大塚生食注５０ｍＬ 1 瓶<br>デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A<br>初回のみ5A投与<br>ガスター注射液２０ｍｇ２ｍＬ 1 A | 00:00 | | | | | | |
| Rp 04<br>中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入<br>90分かけて 側管<br>生理食塩液バッグ「フソー」２５０ｍＬ 1 袋<br>パクリタキセル注 90 mg/㎡ | 00:00 | | | | | | |
| 続き有り | | | | | | | |

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容



発行日時 2022/1/16 15:21

プロトコール名称 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ①⑧⑮ｱﾊﾞｽﾁﾝ①⑮4W

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 外科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2017/ 5/ 2 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2017/ 5/ 2 10:05
承認者 渡邉 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邉 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＣＣｒ 0～ 25 mL/min | % | | ＧＦＲ 0～ 25 mL/min | % | |
| ＣＣｒ 25～ 50 mL/min | % | | ＧＦＲ 25～ 50 mL/min | % | |
| ＣＣｒ 50～ 75 mL/min | % | | ＧＦＲ 50～ 75 mL/min | % | |
| ＣＣｒ 75～100 mL/min | % | | ＧＦＲ 75～100 mL/min | % | |

腎機能の検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＢＵＮ | 25mg/dl | 以上 | Ｓｃｒ | 1.5mg/dl | 以上 |

肝機能の検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＳＴ | 54IU/l | 以上 | ＡＬＴ | 66IU/l | 以上 |
| T-Bil | 1.5mg/dl | 以上 | | | |

ＣＢＣの検査結果値による警告 有り

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白血球 | 30×10^2/μl | 以下 | リンパ球 | 1% | 以下 |
| 好中球 | 15×10^2/μl | 以下 | 血小板 | 7.5×10^4/μl | 以下 |
| ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ | 8g/dL | 以下 | | | |

30日前までの検査結果を参照

| | | | day(15) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処方（前投薬） 院内 | | | | | | | | | |
| Rp 03 | | | 朝 | | | | | | |
| レスタミンコーワ錠１０ｍｇ | 5 | 錠 | | | | | | | |
| ．．1日1回 | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | |
| Rp 01 | | | 00:00 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | 皮下埋込型一般注射液 | | | | | | | | |
| 主管 ルート確保 | ｱﾊﾞｽﾁﾝﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ後ﾌﾗｯｼｭ | | | | | | | | |
| 大塚生食注１００ｍＬ | 1 | 瓶 | | | | | | | |
| Rp 02 | | | 00:00 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 | | | | | | | | |
| 1時間かけて | 初回は90分で投与 | | | | | | | | |
| 側管 | | | | | | | | | |
| 生理食塩液バッグ「フソー」２５０ｍＬ | 1 | 袋 | | | | | | | |
| アバスチン注 | 10 | mg/kg | | | | | | | |
| Rp 03 | | | 00:00 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | 皮下埋込型一般注射液 | | | | | | | | |
| レスタミン服用 | 30分かけて | | | | | | | | |
| 30分あけて ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ投与 | 側管 | | | | | | | | |
| 大塚生食注５０ｍＬ | 1 | 瓶 | | | | | | | |
| デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) | 2 | A | | | | | | | |
| 初回のみ5A投与 | | | | | | | | | |
| ガスター注射液２０ｍｇ２ｍＬ | 1 | A | | | | | | | |
| Rp 04 | | | 00:00 | | | | | | |
| 中心静脈注射 | 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 | | | | | | | | |
| 90分かけて | 側管 | | | | | | | | |
| 生理食塩液バッグ「フソー」２５０ｍＬ | 1 | 袋 | | | | | | | |
| パクリタキセル注 | 90 | mg/㎡ | | | | | | | |
| －以下余白－ | | | | | | | | | |

コメント

参考文献