

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 15:21

プロトコール名称 ★パクリタキセル①⑧ジエムザール①⑧3W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2017/ 5/ 2 10:06
投薬日数	8日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2017/ 5/ 2	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $40 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 1 0 m g ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 主管です。ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注 1 0 0 m L	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 30分あけて パクリタキセル投与 側管① 大塚生食注 5 0 m L デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 初回のみ5A投与 ガスター注射液 2 0 m g 2 m L	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1時間かけて 側管② 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L パクリタキセル注	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 30分かけて 側管③ 大塚生食注 1 0 0 m L ジエムザール注 (1000～1250mg/m ² で使用)	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 15:21

プロトコール名称 ★パクリタキセル①⑧ジエムザール①⑧3W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2017/ 5/ 2 10:06
投薬日数	8日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2017/ 5/ 2	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $40 \times 10^4 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $20 \times 10^4 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (8)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 02 レスタミンコーワ錠10mg ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 主管です。ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注100mL	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 30分あけてパクリタキセル投与 側管① 大塚生食注50mL 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 2 A 初回のみ5A投与 ガスター注射液20mg2mL 1 A	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1時間かけて 側管② 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 パクリタキセル注 80 mg/m ²	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 30分かけて 側管③ 大塚生食注100mL 1 瓶 ジエムザール注 1250 mg/m ² (1000～1250mg/m ² で使用)	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献