

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 14:29

プロトコール名称 FOLFIRI-2 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 15:24
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グラーゼトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 レボホリナート注 200 mg/m ²	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 90分かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 イリノテカン注 150 mg/m ²	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 全開 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶 5 - F U 注 400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 14:29

プロトコール名称 FOLFIRI-2 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 15:24
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
Rp 06 中心静脈注射 46時間かけて 大塚生食注50mL 抗凝)ヘパリンNa注5千単位/5mL「ヘパ」 5-FU注 (2400～3000mg/m2)	00:00						
皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 mL 1 mL 2400 mg/m ² 【冷所保存】 ー以下余白ー							

コメント

参考文献