

# プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 14:33

プロトコール名称 FOLFIRI-2+ベクティビックス 2W

同一グループ

|                            |            |        |                  |
|----------------------------|------------|--------|------------------|
| 疾患名                        | 大腸癌        | 承認区分   | 承認済              |
| 診療科                        | 内科         | 承認日時   | 2019/12/ 8 15:26 |
| 投薬日数                       | 1日         | 承認者    | 森木 康之            |
| 休薬日数                       | 13日        | 承認取消日時 |                  |
| 最大クール数                     | 無制限        | 承認取消者  |                  |
| 心機能の確認                     | 任意         | 更新者    | 森木 康之            |
| 体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式 | DuBois式    |        |                  |
| 有効開始日                      | 2019/12/ 8 | 有効終了日  |                  |

|                     |      |                     |   |
|---------------------|------|---------------------|---|
| 腎機能の値による実投与量の割合     | かけない |                     |   |
| C C r 0～ 25 mL/min  | %    | G F R 0～ 25 mL/min  | % |
| C C r 25～ 50 mL/min | %    | G F R 25～ 50 mL/min | % |
| C C r 50～ 75 mL/min | %    | G F R 50～ 75 mL/min | % |
| C C r 75～100 mL/min | %    | G F R 75～100 mL/min | % |

|                |    |                |    |
|----------------|----|----------------|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 有り |                |    |
| B U N 100mg/dl | 以上 | S c r 2.4mg/dl | 以上 |

|                |    |               |    |
|----------------|----|---------------|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 有り |               |    |
| A S T 135IU/l  | 以上 | A L T 165IU/l | 以上 |
| T-Bil 2mg/dl   | 以上 |               |    |

|                              |    |                              |    |
|------------------------------|----|------------------------------|----|
| C B Cの検査結果値による警告             | 有り |                              |    |
| 白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$ | 以下 | リンパ球 1%                      | 以下 |
| 好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$ | 以下 | 血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$ | 以下 |
| ヘモグロビン 8g/dL                 | 以下 |                              |    |

30日前までの検査結果を参照

|                                                                                                                                                             | day (1) |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 注射                                                                                                                                                          |         |  |  |  |  |  |  |
| Rp 01<br>中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液<br>30分かけて<br>デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶<br>デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 1 A<br>グラネセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋 | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 02<br>中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液<br>ベクティビックス前後のフラッシュ<br>大塚生食注 5 0 m L 1 瓶                                                                                         | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 03<br>中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入<br>1時間かけて<br>大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶<br>ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g 5 m L 6 mg/kg                                                    | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 04<br>中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液<br>2時間かけて<br>大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋<br>レボホリナート注 200 mg/m <sup>2</sup>                                                            | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 05<br>中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入<br>90分かけて LVと同時投与<br>大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋<br>イリノテカン注 150 mg/m <sup>2</sup>                                                | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 06<br>中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入<br>全開<br>大塚生食注 5 0 m L 1 瓶<br>5 - F U 注 400 mg/m <sup>2</sup><br>【冷所保存】                                                     | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                             |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                             |         |  |  |  |  |  |  |

続き有り

コメント

参考文献

## 2 / 2

14:33

同一グループ

承認区分 承認済  
承認日時 2019/12/ 8 15:26  
承認者 森木 康之  
承認取消日時  
承認取消者  
更新者 森木 康之

|     |        |        |   |
|-----|--------|--------|---|
| GFR | 0~25   | mL/min | % |
| GFR | 25~50  | mL/min | % |
| GFR | 50~75  | mL/min | % |
| GFR | 75~100 | mL/min | % |

|                |          |    |       |          |
|----------------|----------|----|-------|----------|
| 肝機能の検査結果値による警告 |          | 有り |       |          |
| A S T          | 135 IU/l | 以上 | A L T | 165 IU/l |
| T-Bil          | 2mg/dl   | 以上 |       | 以上       |

| CBCの検査結果値による警告 |                                |    |      |                                |    |
|----------------|--------------------------------|----|------|--------------------------------|----|
| 白血球            | $30 \times 10^2 / \mu\text{l}$ | 以下 | リンパ球 | 1%                             | 以下 |
| 好中球            | $15 \times 10^2 / \mu\text{l}$ | 以下 | 血小板  | $10 \times 10^4 / \mu\text{l}$ | 以下 |
| ヘモグロビン         | 8 g/dL                         | 以下 |      |                                |    |

30 日前までの検査結果を参照

コメント

## 参考文献