

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 14:33

プロトコール名称 FOLFOX4 2W

同一グループ

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|------------------|
| 疾患名 | 大腸癌 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | 2019/12/ 8 15:26 |
| 投薬日数 | 2日 | 承認者 | 森木 康之 |
| 休薬日数 | 12日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 森木 康之 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2019/12/ 8 | 有効終了日 | |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|---------|----|-----|----------|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 有り | | | |
| BUN | 20mg/dl | 以上 | Scr | 1.2mg/dl |
| | | | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|----------|----|-----|----------|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 有り | | | |
| AST | 67.5IU/l | 以上 | ALT | 82.5IU/l |
| T-Bil | 1.5mg/dl | 以上 | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|--------------------------|----|------|---------------------------|
| CBCの検査結果値による警告 | 有り | | | |
| 白血球 | $30 \times 10^2 / \mu l$ | 以下 | リンパ球 | 1% |
| 好中球 | $15 \times 10^2 / \mu l$ | 以下 | 血小板 | $7.5 \times 10^4 / \mu l$ |
| ヘモグロビン | 8g/dL | 以下 | | 以下 |

30日前までの検査結果を参照

| | day (1) | day (2) | | | | | |
|---|---------|---------|--|--|--|--|------|
| 注射 | | | | | | | |
| Rp 01 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液 6.6mg/2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グレセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋 皮下埋込型一般注射液 | 00:00 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | |
| Rp 02 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グレセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋 皮下埋込型一般注射液 | | 00:00 | | | | | |
| Rp 03 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5% 250mL 1 袋 レボホリナート注 100 mg/m ² 皮下埋込型一般注射液 | 00:00 | 00:00 | | | | | |
| 注射 | | | | | | | |
| Rp 04 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5% 250mL 1 袋 エルプラット注 85 mg/m ² 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 LVと同時投与 | 00:00 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | |
| Rp 05 中心静脈注射 全開 大塚生食注 50mL 1 瓶 5-FU注 400 mg/m ² 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 【冷所保存】 | 00:00 | 00:00 | | | | | |
| | | | | | | | 続き有り |

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 14:33

プロトコル名称 FOLFOX4 2W

同一グループ

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|------------------|
| 疾患名 | 大腸癌 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | 2019/12/ 8 15:26 |
| 投薬日数 | 2日 | 承認者 | 森木 康之 |
| 休薬日数 | 12日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 森木 康之 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2019/12/ 8 | 有効終了日 | |

| | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % |

| | | | |
|----------------|----|--------------|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 有り | | |
| BUN 20mg/dl | 以上 | Scr 1.2mg/dl | 以上 |

| | | | |
|----------------|----|--------------|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 有り | | |
| AST 67.5IU/l | 以上 | ALT 82.5IU/l | 以上 |
| T-Bil 1.5mg/dl | 以上 | | |

| | | | |
|------------------------------|----|-------------------------------|----|
| CBCの検査結果値による警告 | 有り | | |
| 白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$ | 以下 | リンパ球 1% | 以下 |
| 好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$ | 以下 | 血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$ | 以下 |
| ヘモグロビン 8g/dL | 以下 | | |

30日前までの検査結果を参照

| | day (1) | day (2) | | | | | |
|---|---------|---------|----------------|-----|-----------------------|--------|--|
| Rp 06 中心静脈注射 22時間かけて テルモ生食500mL 5-FU注 | 00:00 | 00:00 | 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 | 1 袋 | 600 mg/m ² | 【冷所保存】 | |
| Rp 07 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL | | 00:00 | 皮下埋込型一般注射液 | 1 瓶 | | -以下余白- | |

コメント

参考文献