

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/1/16 14:33

プロトコール名称 FOLFOX4+アビタックス 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 15:26
投薬日数	8日	承認者	森木 康之
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 10mg 5 錠 アビタックス投与30分前に内服 ... 1日1回	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6.6mg/2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グラネセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
注射							
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グラネセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
注射							
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注 100mL 1 瓶	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 1 袋 アビタックス注射液 100mg 20mL 250 mg/m ² 初回は400mg/m ² /2h	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/1/16 14:33

プロトコール名称 FOLFOX4+アビタックス 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 15:26
投薬日数	8日	承認者	森木 康之
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06 中心静脈注射 フラッシュのみアビタックスと 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 皮下埋込型一般注射液 同じ投与速度	00:00						
注射							
Rp 07 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 レボホリナート注 100 mg/m ² 皮下埋込型一般注射液	00:00	00:00					
注射							
Rp 08 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 エルプラット注 85 mg/m ² 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 LVと同時投与	00:00						
注射							
Rp 09 中心静脈注射 全開 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶 5 - F U 注 400 mg/m ² 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 【冷所保存】	00:00	00:00					
注射							
Rp 10 中心静脈注射 22時間かけて テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋 5 - F U 注 600 mg/m ² 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 【冷所保存】	00:00	00:00					
注射							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/1/16 14:33

プロトコール名称 FOLFOX4+アベグタックス 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 15:26
投薬日数	8日	承認者	森木 康之
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r	1. 2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67. 5IU/l	以上	A L T	82. 5IU/l 以上
T-Bil 1. 5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1% 以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$7. 5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8 g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 11 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL		00:00					
皮下埋込型一般注射液 1 瓶							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/1/16 14:33

プロトコール名称 FOLFOX4+アービタックス 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 15:26
投薬日数	8日	承認者	森木 康之
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (8)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 02 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 アービタックス投与30分前に内服 ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デ ^カ ト ^ロ ソ ^ン) 2 A	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 アービタックス注射液 1 0 0 m g 2 0 m L 250 mg/m ² 初回は400mg/m ² /2h	00:00						
Rp 06 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 フラッシュのみアービタックスと 同じ投与速度 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献