

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/1/16 14:34

プロトコール名称 XELIRI+アバスチン 3W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:19
投薬日数	1日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 100IU/l	以上	A L T 100IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 ゼロータ2投1休 800mg/m2/回 30分かけて デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 1 A グラセトン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 アバスチン投与前後でフラッシュ イリノテカン終了後フラッシュ 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 90分かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 アバスチン注 7.5 mg/kg	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 90分かけて 大塚糖液5%250mL 1 袋 イリノテカン注 200 mg/m ²	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献