

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 14:34

プロトコール名称 mFOLFOX6+ベクティビックス 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:35
投薬日数	1日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 ベクティビックス前後のフラッシュ 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1時間かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g 5 m L 6 mg/kg	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 レボホリナート注 200 mg/m ²	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 2時間かけて LVと同時投与 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 エルプラット注 85 mg/m ²	00:00						
Rp 06 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 全開 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶 5 - F U 注 400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00						

続き有り

コメント

参考文献

2 / 2

発行日時 2022/1/16 14:34

同一グループ

疾患名	大腸癌
診療科	内科
投薬日数	1日
休薬日数	13日
最大クール数	無制限
心機能の確認	任意
体表面積 (m ²)	計算式
有効開始日	2020/ 1/

承認区分	承認済
承認日時	2020/ 1/ 1 10:35
承認者	渡邊 哲也
承認取消日時	
承認取消者	
更新者	渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
C C r	0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min %
C C r	25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min %
C C r	50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min %
C C r	75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告	有り
BUN 20mg/dl	以上
S c r	1.2mg/dl
	以上

肝機能の検査結果値による警告		有り			
A S T	67.5 IU/l	以上	A L T	82.5 IU/l	以上
T-Bil	1.5 mg/dl	以上			

CBCの検査結果値による警告					
白血球	$30 \times 10^2 / \mu\text{l}$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球	$15 \times 10^2 / \mu\text{l}$	以下	血小板	$7.5 \times 10^4 / \mu\text{l}$	以下
ヘモグロビン	8 g/dL	以下			

30 日前までの検査結果を参照

		day (1)					
Rp 07	中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L	皮下埋込型一般注射液 1 瓶	00:00				
Rp 08	中心静脈注射 46時間かけて 大塚生食注 5 0 m L 抗凝) ヘパリンN a 注 5 千単位／5mL「ネチダ®」 5 - F U 注 (2400～3000mg/m ²)	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 ml 1 ml 2400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00				
		ー以下余白ー					

コメント

参考文献