

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 sLV5FU2+ベクティビックス 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:44
投薬日数	1日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デ`カト`ロン) 1 瓶 ゲ`ラセトロン点滴静注`バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 ベクティビックス前後のフラッシュ 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1時間かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g 5 m L 6 mg/kg	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 レボホリナート注 200 mg/m ²	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 全開 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶 5 - F U 注 400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00						
Rp 06 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 sLV5FU2+ヘパティックス 2W

同一グループ

疾患名 大腸癌

診療科 内科

投薬日数 1日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2020/ 1/ 1 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2020/ 1/ 1 10:44

承認者

渡邊 哲也

承認取消日時

承認取消者

更新者

渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告 有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

A S T 135IU/l

以上

A L T

165IU/l

以上

T-Bil 3mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告 有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 8g/dl

以下

30日前までの検査結果を参照

Rp 07

中心静脈注射

皮下埋込型抗癌剤局所持続注入

46時間かけて

大塚生食注 50mL

1

mL

抗凝)ヘパリンNa注5千単位/5mL「ヘパ」

1

mL

5-FU注

2400

mg/m²

(2400～3000mg/m2)

【冷所保存】

ー以下余白ー

day (1)

00:00

コメント

参考文献