

プロトコールマスター内容

1 / 7

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 伊リテカン①⑧⑮+ア-ビタックス①⑧⑮22

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:49
投薬日数	22 日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	6 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 ．．1日1回 ア-ビタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6 . 6 mg / 2 mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グ-ネヒトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
注射							
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 ア-ビタックス注射液 1 0 0 m g 2 0 m L 250 mg / m ² 初回は400mg / m ² / 2h	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 1時間かけて ア-ビタックスと同じ投与速度でフラ 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 7

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑮+アービタックス①⑧⑮22

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:49
投薬日数	22日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 06 中心静脈注射 90分かけて テルモ生食500mL イリノテカン注	00:00						
皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 袋 100 mg/m ²							
Rp 07 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL	00:00						
皮下埋込型一般注射液 1 瓶							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 7

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 イリナカン①⑧⑮+アービタックス①⑧⑮22

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:49
投薬日数	22 日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	6 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方（前投薬） 院内							
Rp 02 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 ．．1日1回 アービタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6． 6 mg/ 2 mL (デ`カ`ト`ロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0. 5mL) (デ`カ`ト`ロン) 1 A グ`ラ`ニ`セ`ト`ロン点滴静注`バ`グ` 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
注射							
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 アービタックス注射液 1 0 0 m g 2 0 m L 250 mg/m ² 初回は400mg/m ² /2h	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 1時間かけて アービタックスと同じ投与速度でフラ 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 7

発行日時 2022/1/16

14:56

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬+アークタックス①⑧⑬22

同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 内科
投薬日数 22日
休薬日数 6日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 1/ 1 有効終了日

承認区分
承認日時 2020/ 1/ 1 10:49
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$ 以下 血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 06 中心静脈注射 90分かけて テルモ生食500mL イリノテカン注	00:00						
皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 袋 100 mg/m ²							
Rp 07 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL	00:00						
皮下埋込型一般注射液 1 瓶							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 7

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 イリナカン①⑧⑬+アービタックス①⑧⑬22

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:49
投薬日数	22 日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	6 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方（前投薬） 院内							
Rp 03 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 ．．1日1回 アービタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6． 6 mg/ 2mL (デ ^カ ト ^ロ ン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg (0. 5mL) (デ ^カ ト ^ロ ン) 1 A グ ^ラ ニセ ^ト ロン点滴静注 ^バ グ ^ク 1mg/50mL「HK」(カイト ^リ ル) 1 袋	00:00						
注射							
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 アービタックス注射液 1 0 0 m g 2 0 m L 250 mg/m ² 初回は400mg/m ² /2h	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 1時間かけて アービタックスと同じ投与速度でフラ 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

6 / 7

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑮+アーベタックス①⑧⑮22

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:49
投薬日数	22日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射							
Rp 06 中心静脈注射 90分かけて テルモ生食500mL イリノテカン注	00:00						
皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 袋 100 mg/m ²							
Rp 07 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL	00:00						
皮下埋込型一般注射液 1 瓶							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

7 / 7

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 イリナカン①⑧⑮+アービタックス①⑧⑮22

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:49
投薬日数	22日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (22)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 04 レスタミンコーワ錠10mg ．．1日1回 アービタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて 大塚生食注100mL 1 瓶 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 2 A	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 アービタックス注射液100mg 20mL 250 mg/m ² 初回は400mg/m ² /2h	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 1時間かけて アービタックスと同じ投与速度でフラ 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献