

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬+ベクティックス①⑬ 4W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:50
投薬日数	15 日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135 IU/l	以上	A L T 165 IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8 g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 1 A グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 ベクティビックス前後のフラッシュ 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1時間かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g 5 m L 6 mg/kg	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 90分かけて テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋 イリノテカン注 100 mg/m ²	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬+ベクティックス①⑬ 4W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:50
投薬日数	15 日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135 IU/l	以上	A L T 165 IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8 g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2 mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 1 A グラネセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 90分かけて テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋 イリノテカン注 100 mg/m ²	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬+ベクティビックス①⑬ 4W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:50
投薬日数	15 日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135 IU/l	以上	A L T 165 IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (15)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 1 A グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 ベクティビックス前後のフラッシュ 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1時間かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g 5 m L 6 mg/kg	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 90分かけて テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋 イリノテカン注 100 mg/m ²	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献