

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 イリノテカン①⑮+ベクティビックス①⑮ 4W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2021/ 3/23 08:48
投薬日数	15 日	承認者	森木 康之
休薬日数	13 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 3/23	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135 IU/l	以上	A L T 165 IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8 g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A デキサート注射液6.6 mg/2mL (デカトロン) 1 瓶 グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 ベクティビックスの前後に 半量ずつフラッシュ 大塚生食注 50mL 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1時間かけて 大塚生食注 100mL 1 瓶 ベクティビックス点滴静注 100mg 5mL 6 mg/kg	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 2時間かけて テルモ生食 500mL 1 袋 イリノテカン注 150 mg/m ²	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 ルート確保 フラッシュ用 大塚生食注 50mL 1 瓶	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 イリノテカン①⑬+ベクティックス①⑬ 4W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2021/ 3/23 08:48
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 3/23	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A デキサート注射液6.6mg/2mL (デカトロン) 1 瓶 グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 ベクティックスの前後に 半量ずつフラッシュ 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1時間かけて 大塚生食注100mL 1 瓶 ベクティックス点滴静注100mg 5mL 6 mg/kg	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 2時間かけて テルモ生食500mL 1 袋 イリノテカン注 150 mg/m ²	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 ルート確保 フラッシュ用 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献