

プロトコルマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコル名称 サイラムザ[®]①+FOLFIRI-2 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:23
投薬日数	1日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 135IU/l	以上	ALT 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 30×10 ² /μl	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 15×10 ² /μl	以下	血小板 10×10 ⁴ /μl	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠 ... 1日1回 サイラムザ投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6.6mg/2mL (デカトロン) 1瓶 デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1A グレシロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトル) 1袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 サイラムザ前後でフラッシュ 2クール目までは観察時使用 レスタミン後30分空けサイラムザ投与 大塚生食注 100mL 1瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 最初の2サイクルは投与後 1時間の観察が必要 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 1袋 サイラムザ点滴静注 8mg/kg	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 2時間かけて 大塚糖液 5% 250mL 1袋 レボホリナート注 200mg/m ²	00:00						
							続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 14:56

プロトコール名称 サイタマ[®]①+FOLFIRI-2 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:23
投薬日数	1日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 135IU/l	以上	ALT 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
Rp 05 中心静脈注射 90分かけて 大塚糖液5%250mL イリノテカン注 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 LVと同時投与 1 袋 150 mg/m ²	00:00						
Rp 06 中心静脈注射 全開 大塚生食注50mL 5-FU注 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 瓶 400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00						
Rp 07 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL 皮下埋込型一般注射液 1 瓶	00:00						
Rp 08 中心静脈注射 46時間かけて 大塚生食注50mL 抗凝)ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 5-FU注 (2400~3000mg/m ²) 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 ml 1 ml 2400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00						
-以下余白-							

コメント

参考文献