

プロトコールマスター内容

1 / 1 2

発行日時 2022/1/16

15:35

プロトコール名称 パクリタキセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 内科
投薬日数 36日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 1/15

有効終了日

承認区分
承認日時 2020/ 1/15 15:59
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0～ 25 mL/min	%	G F R	0～ 25 mL/min	%
C C r	25～ 50 mL/min	%	G F R	25～ 50 mL/min	%
C C r	50～ 75 mL/min	%	G F R	50～ 75 mL/min	%
C C r	75～100 mL/min	%	G F R	75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 25mg/dl 以上 S c r 1. 5mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 54IU/l 以上 A L T 66IU/l 以上
T-Bil 1. 5mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り
白血球 $20 \times 10^4 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $10 \times 10^4 / \mu l$ 以下 血小板 $7. 5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 9g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 パクリタキセル投与30分前に内服 ．． 1日1回	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 30分かけて デキサート注射液 6． 6 mg/ 2 mL (デ`カ`ト`ロン) 1 瓶 デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デ`カ`ト`ロン) 1 A 2回目から減量可 ケラニセトロン点滴静注`バッグ` 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 静脈内注射 静脈内注射 レスタミン服用 ゆっくりと 30分あけて パクリタキセル投与 大塚生食注 2 0 m L 1 A ガスター注射液 2 0 m g 2 m L 1 A	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 30分かけて 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 DAY①は好中球 1 5 0 0 以上 パクリタキセル注 100 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 1 2

発行日時 2022/1/16

15:35

プロトコール名称 パクリタキセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名 食道癌

診療科 内科

投薬日数 36日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2020/ 1/15

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2020/ 1/15 15:59

承認者

渡邊 哲也

承認取消日時

承認取消者

更新者

渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 25mg/dl

以上

S c r

1. 5mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 54IU/l

以上

A L T

66IU/l

以上

T-Bil 1. 5mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $7. 5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 9g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 05 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL	00:00						
点滴注射							
1 瓶							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 1 2

発行日時 2022/1/16

15:35

プロトコール名称 パクリタセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 内科
投薬日数 36日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 1/15

承認区分
承認日時 2020/ 1/15 15:59
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない
C C r 0～ 25 mL/min %
C C r 25～ 50 mL/min %
C C r 50～ 75 mL/min %
C C r 75～100 mL/min %

G F R 0～ 25 mL/min %
G F R 25～ 50 mL/min %
G F R 50～ 75 mL/min %
G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 25mg/dl 以上 S c r 1. 5mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 54IU/l 以上 A L T 66IU/l 以上
T-Bil 1. 5mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り
白血球 $20 \times 10^4 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $10 \times 10^4 / \mu l$ 以下 血小板 $7. 5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 9g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方（前投薬） 院内							
Rp 02 レスタミンコーワ錠10mg 5 錠 パクリタキセル投与30分前に内服 ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 30分かけて デキサート注射液6．6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 1 A 2回目から減量可 ケラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 静脈内注射 静脈内注射 レスタミン服用 ゆっくりと 30分あけて パクリタキセル投与 大塚生食注20mL 1 A ガスター注射液20mg2mL 1 A	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 30分かけて 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 DAY①は好中球1500以上 パクリタキセル注 100 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 1 2

発行日時 2022/1/16

15:35

プロトコール名称 パクリタキセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名 食道癌

診療科 内科

投薬日数 36日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2020/ 1/15

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2020/ 1/15 15:59

承認者

渡邊 哲也

承認取消日時

承認取消者

更新者

渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 25mg/dl

以上

S c r

1. 5mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 54IU/l

以上

A L T

66IU/l

以上

T-Bil 1. 5mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $7. 5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 9g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 05 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL	00:00						
点滴注射							
1 瓶							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 1 2

発行日時 2022/1/16

15:35

プロトコール名称 パクリタキセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 内科
投薬日数 36日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 1/15

承認区分
承認日時 2020/ 1/15 15:59
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 25mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 54IU/l	以上	A L T 66IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^4 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方 (前投薬) 院内							
Rp 03 レスタミンコーワ錠 10mg 5 錠 パクリタキセル投与30分前に内服 ... 1日1回	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 30分かけて デキサート注射液 6.6mg/2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A 2回目から減量可 ケラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 静脈内注射 静脈内注射 レスタミン服用 ゆっくりと 30分あけて パクリタキセル投与 大塚生食注 20mL 1 A ガスター注射液 20mg 2mL 1 A	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 30分かけて 大塚生食注 50mL 1 瓶	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 1 袋 DAY①は好中球 1500以上 パクリタキセル注 100 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

6 / 1 2

発行日時 2022/1/16

15:35

プロトコール名称 パクリタキセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名 食道癌

診療科 内科

投薬日数 36日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2020/ 1/15

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2020/ 1/15 15:59

承認者

渡邊 哲也

承認取消日時

承認取消者

更新者

渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0~ 25 mL/min

%

G F R 0~ 25 mL/min

%

C C r 25~ 50 mL/min

%

G F R 25~ 50 mL/min

%

C C r 50~ 75 mL/min

%

G F R 50~ 75 mL/min

%

C C r 75~100 mL/min

%

G F R 75~100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 25mg/dl

以上

S c r

1. 5mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 54IU/l

以上

A L T

66IU/l

以上

T-Bil 1. 5mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $7. 5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 9g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

Rp 05

点滴注射

点滴注射

フラッシュ用

大塚生食注50mL

1 瓶

続き有り

day (15) day (16) day (17) day (18) day (19) day (20) day (21)

00:00

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

7 / 1 2

発行日時 2022/1/16

15:35

プロトコール名称 パクリタキセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 内科
投薬日数 36日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 1/15

承認区分
承認日時 2020/ 1/15 15:59
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない
C C r 0～ 25 mL/min %
C C r 25～ 50 mL/min %
C C r 50～ 75 mL/min %
C C r 75～100 mL/min %

G F R 0～ 25 mL/min %
G F R 25～ 50 mL/min %
G F R 50～ 75 mL/min %
G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 25mg/dl 以上 S c r 1. 5mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 54IU/l 以上 A L T 66IU/l 以上
T-Bil 1. 5mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り
白血球 $20 \times 10^4 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $10 \times 10^4 / \mu l$ 以下 血小板 $7. 5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 9g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
処方（前投薬） 院内							
Rp 04 レスタミンコーワ錠10mg 5 錠 パクリタキセル投与30分前に内服 ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 30分かけて デキサート注射液6．6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 1 A 2回目から減量可 ケラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 静脈内注射 静脈内注射 レスタミン服用 ゆっくりと 30分あけて パクリタキセル投与 大塚生食注20mL 1 A ガスター注射液20mg2mL 1 A	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 30分かけて 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 DAY①は好中球1500以上 パクリタキセル注 100 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

8 / 1 2

発行日時 2022/1/16

15:35

プロトコール名称 パクリタキセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名 食道癌

診療科 内科

投薬日数 36日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2020/ 1/15

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2020/ 1/15 15:59

承認者

渡邊 哲也

承認取消日時

承認取消者

更新者

渡邊 哲也

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0~ 25 mL/min

%

G F R 0~ 25 mL/min

%

C C r 25~ 50 mL/min

%

G F R 25~ 50 mL/min

%

C C r 50~ 75 mL/min

%

G F R 50~ 75 mL/min

%

C C r 75~100 mL/min

%

G F R 75~100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 25mg/dl

以上

S c r

1. 5mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 54IU/l

以上

A L T

66IU/l

以上

T-Bil 1. 5mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $7. 5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 9g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 05 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL	00:00						
点滴注射							
1 瓶							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

9 / 1 2

発行日時 2022/1/16

15:35

プロトコール名称 パクリタキセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名	食道癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/15 15:59
投薬日数	36日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 25mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 54IU/l	以上	A L T 66IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^4 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
処方（前投薬） 院内							
Rp 05 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 パクリタキセル投与30分前に内服 ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 30分かけて デキサート注射液 6． 6 mg/ 2 mL (デ`カ`ロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0. 5mL) (デ`カ`ロン) 1 A 2回目から減量可 ケラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 静脈内注射 静脈内注射 レスタミン服用 ゆっくりと 30分あけて パクリタキセル投与 大塚生食注 2 0 m L 1 A ガスター注射液 2 0 m g 2 m L 1 A	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 30分かけて 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 DAY①は好中球 1 5 0 0 以上 パクリタキセル注 100 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/1/16 10/12 15:35

プロトコール名称 パクリタキセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名	食道癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/15 15:59
投薬日数	36日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0~ 25 mL/min	%	G F R 0~ 25 mL/min	%
C C r 25~ 50 mL/min	%	G F R 25~ 50 mL/min	%
C C r 50~ 75 mL/min	%	G F R 50~ 75 mL/min	%
C C r 75~100 mL/min	%	G F R 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 25mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 54IU/l	以上	A L T 66IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
Rp 05 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL 点滴注射 1 瓶	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

1 1 / 1 2

発行日時 2022/1/16

15:35

プロトコール名称 パクリタセル毎週6W投1W休 7W

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 内科
投薬日数 36日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 1/15

承認区分
承認日時 2020/ 1/15 15:59
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%	
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%	
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%	
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
B U N 25mg/dl	以上	S c r	1. 5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
A S T 54IU/l	以上	A L T	66IU/l	以上
T-Bil 1. 5mg/dl	以上			

C B Cの検査結果値による警告	有り			
白血球 $20 \times 10^4 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下	血小板	$7. 5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day (36)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 06 レスタミンコーワ錠10mg パクリタキセル投与30分前に内服 ．．1日1回	朝						
5錠							
注射							
Rp 01 点滴注射 30分かけて デキサート注射液6．6mg/2mL(デカトロン) デキサート注射液1. 65mg(0. 5mL)(デカトロン) 2回目から減量可 ケラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル)	00:00						
点滴注射							
1瓶							
1A							
1袋							
Rp 02 静脈内注射 レスタミン服用 30分あけてパクリタキセル投与 大塚生食注20mL ガスター注射液20mg2mL	00:00						
静脈内注射 ゆっくりと							
1A							
1A							
Rp 03 点滴注射 30分かけて 大塚生食注50mL	00:00						
点滴注射							
1瓶							
Rp 04 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL DAY①は好中球1500以上 パクリタキセル注	00:00						
点滴注射							
1袋							
100mg/m ²							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容										1 2 / 1 2	
発行日時 2022/1/16										15:35	
プロトコール名称 パクリタキセル毎週6W投1W休 7W											
同一グループ											
疾患名 食道癌				承認区分				承認済			
診療科 内科				承認日時				2020/ 1/15 15:59			
投薬日数 36日				承認者				渡邊 哲也			
休薬日数 13日				承認取消日時							
最大クール数 無制限				承認取消者							
心機能の確認 任意				更新者				渡邊 哲也			
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2020/ 1/15 有効終了日											
腎機能の値による実投与量の割合 かけない											
C C r 0～ 25 mL/min			%			G F R 0～ 25 mL/min			%		
C C r 25～ 50 mL/min			%			G F R 25～ 50 mL/min			%		
C C r 50～ 75 mL/min			%			G F R 50～ 75 mL/min			%		
C C r 75～100 mL/min			%			G F R 75～100 mL/min			%		
腎機能の検査結果値による警告 有り											
B U N 25mg/dl			以上			S c r			1. 5mg/dl 以上		
肝機能の検査結果値による警告 有り											
A S T 54IU/l			以上			A L T			66IU/l 以上		
T-Bil 1. 5mg/dl			以上								
C B Cの検査結果値による警告 有り											
白血球 $20 \times 10^2/\mu l$			以下			リンパ球			1% 以下		
好中球 $10 \times 10^2/\mu l$			以下			血小板			$7. 5 \times 10^4/\mu l$ 以下		
ヘモグロビン 9g/dL			以下								
30日前までの検査結果を参照											
						day (36)					
Rp 05						00:00					
点滴注射											
フラッシュ用											
大塚生食注50mL											
1 瓶											
-以下余白-											
コメント											
参考文献											