

# プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/1/16 15:45

プロトコール名称 mFOLFIRINOX 2W

同一グループ

|                            |            |        |                  |
|----------------------------|------------|--------|------------------|
| 疾患名                        | 膵臓癌        | 承認区分   | 承認済              |
| 診療科                        | 内科         | 承認日時   | 2019/10/15 10:41 |
| 投薬日数                       | 1日         | 承認者    | 森木 康之            |
| 休薬日数                       | 13日        | 承認取消日時 |                  |
| 最大クール数                     | 無制限        | 承認取消者  |                  |
| 心機能の確認                     | 任意         | 更新者    | 森木 康之            |
| 体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式 | DuBois式    |        |                  |
| 有効開始日                      | 2019/10/15 | 有効終了日  |                  |

|                   |      |                   |   |
|-------------------|------|-------------------|---|
| 腎機能の値による実投与量の割合   | かけない |                   |   |
| CCr 0～25 mL/min   | %    | GFR 0～25 mL/min   | % |
| CCr 25～50 mL/min  | %    | GFR 25～50 mL/min  | % |
| CCr 50～75 mL/min  | %    | GFR 50～75 mL/min  | % |
| CCr 75～100 mL/min | %    | GFR 75～100 mL/min | % |

|                |    |              |    |
|----------------|----|--------------|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 有り |              |    |
| BUN 100mg/dl   | 以上 | Scr 2.4mg/dl | 以上 |

|                |    |             |    |
|----------------|----|-------------|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 有り |             |    |
| AST 135IU/l    | 以上 | ALT 165IU/l | 以上 |
| T-Bil 2.2mg/dl | 以上 |             |    |

|                                    |    |                                     |    |
|------------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| CBCの検査結果値による警告                     | 有り |                                     |    |
| 白血球 $30 \times 10^2 / \mu\text{l}$ | 以下 | リンパ球 $1\%$                          | 以下 |
| 好中球 $15 \times 10^2 / \mu\text{l}$ | 以下 | 血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu\text{l}$ | 以下 |
| ヘモグロビン 8g/dl                       | 以下 |                                     |    |

30日前までの検査結果を参照

|                                                                                                                                                 | day (1) |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 注射                                                                                                                                              |         |  |  |  |  |  |  |
| Rp 01<br>中心静脈注射<br>30分かけて<br>デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶<br>デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 1 A<br>グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトル) 1 袋 | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 02<br>中心静脈注射<br>2時間かけて<br>大塚糖液 5 % 250 mL 1 袋<br>オキサリプラチン注 85 mg/m <sup>2</sup>                                                              | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 03<br>中心静脈注射<br>2時間かけて<br>大塚糖液 5 % 250 mL 1 袋<br>レボホリナート注 200 mg/m <sup>2</sup>                                                              | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 04<br>中心静脈注射<br>LV開始30分後から投与<br>大塚糖液 5 % 500 mL 1 袋<br>イリノテカン注 150 mg/m <sup>2</sup>                                                         | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 05<br>中心静脈注射<br>フラッシュ用<br>大塚生食注 50 mL 1 瓶                                                                                                    | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 06<br>中心静脈注射<br>46時間かけて<br>大塚生食注 50 mL 1 mL<br>抗凝) ヘパリンNa 注 5千単位/5mL「ヘパ」 1 mL<br>5-FU注 2400 mg/m <sup>2</sup><br>【冷所保存】                      | 00:00   |  |  |  |  |  |  |
| ー以下余白ー                                                                                                                                          |         |  |  |  |  |  |  |

コメント

参考文献