

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 15:42

プロトコール名称 TS-1①～⑭ジェムザール①⑧ 3W

同一グループ

疾患名	胆管・胆嚢癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:40
投薬日数	14日	承認者	森木 康之
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 点滴注射 30分かけて TS-1併用レジメンです ゲラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン)	00:00 点滴注射 TS-1 2W投与1W休薬 TS-1 60～100mg/Body 2W投1W休 1 袋 1 瓶						
Rp 02 点滴注射 30分かけて 大塚生食注 1 0 0 m L ジェムザール注	00:00 点滴注射 1 瓶 1000 mg/m ²						
Rp 03 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L	00:00 点滴注射 1 瓶						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 15:42

プロトコール名称 TS-1①～⑭ジェムザール①⑧ 3W

同一グループ

疾患名	胆管・胆嚢癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:40
投薬日数	14日	承認者	森木 康之
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 01 点滴注射 30分かけて TS-1併用レジメンです ゲラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン)	00:00 点滴注射 TS-1 2W投与1W休薬 TS-1 60～100mg/Body 2W投1W休 1 袋 1 瓶						
Rp 02 点滴注射 30分かけて 大塚生食注 1 0 0 m L ジェムザール注	00:00 点滴注射 1 瓶 1000 mg/m ²						
Rp 03 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L	00:00 点滴注射 1 瓶						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献