

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 キイトルーダ400mg① 6W

同一グループ

疾患名 MS I - H i g hを有する固形癌
 診療科 内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 41日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 1/28 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 1/28 12:11
 承認者 森木 康之
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り

BUN 100mg/dl	以上	Scr	1.2mg/dl	以上
--------------	----	-----	----------	----

肝機能の検査結果値による警告 有り

AST 81IU/l	以上	ALT	99IU/l	以上
T-Bil 2.2mg/dl	以上			

CBCの検査結果値による警告 有り

白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 10g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 点滴注射 主管：ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注100mL	00:00						
点滴注射 1 瓶							
Rp 02 点滴注射 30分かけて 大塚生食注100mL キイトルーダ点滴静注100mg/4mL	00:00						
点滴注射 インラインフィルターを使用 1 瓶 400 mg/Body 【冷所保存】							
-以下余白-							

コメント

参考文献