

# プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/4/8

18:04

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬アクプラ① 4W

同一グループ

疾患名 神経内分泌癌 NEC（小細胞型）  
診療科 内科  
投薬日数 15日  
休薬日数 13日  
最大クール数 4クール  
心機能の確認 任意  
体表面積（m<sup>2</sup>）計算式 DuBois式  
有効開始日 2022/ 1/28 有効終了日

承認区分  
承認日時 2022/ 1/28 12:12  
承認者 森木 康之  
承認取消日時  
承認取消者  
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

|       |        |        |   |       |        |        |   |
|-------|--------|--------|---|-------|--------|--------|---|
| C C r | 0～ 25  | mL/min | % | G F R | 0～ 25  | mL/min | % |
| C C r | 25～ 50 | mL/min | % | G F R | 25～ 50 | mL/min | % |
| C C r | 50～ 75 | mL/min | % | G F R | 50～ 75 | mL/min | % |
| C C r | 75～100 | mL/min | % | G F R | 75～100 | mL/min | % |

腎機能の検査結果値による警告 有り  
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り  
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上  
T-Bil 2mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り  
白血球  $30 \times 10^2 / \mu l$  以下 リンパ球 1% 以下  
好中球  $15 \times 10^2 / \mu l$  以下 血小板  $10 \times 10^4 / \mu l$  以下  
ヘモグロビン 8g/dl 以下

30日前までの検査結果を参照

|                                                                                                                                                  | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 注射                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 01<br>点滴注射 点滴注射<br>30分かけて<br>デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶<br>デキサート注射液1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 1 A<br>グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトル) 1 袋 | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| Rp 02<br>点滴注射 点滴注射<br>90分かけて<br>テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋<br>イリノテカン注 60 mg/ m <sup>2</sup>                                                             | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| 注射                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 03<br>点滴注射 点滴注射<br>2時間かけて<br>テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋<br>アクプラ注 60 mg/ m <sup>2</sup>                                                               | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| Rp 04<br>点滴注射 点滴注射<br>90分かけて<br>テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋                                                                                              | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| Rp 05<br>点滴注射 点滴注射<br>90分かけて<br>テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋                                                                                              | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| 続き有り                                                                                                                                             |         |         |         |         |         |         |         |

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/4/8

18:04

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬アクトラ① 4W

同一グループ

疾患名 神経内分泌癌 NEC（小細胞型）  
診療科 内科  
投薬日数 15日  
休薬日数 13日  
最大クール数 4クール  
心機能の確認 任意  
体表面積（m<sup>2</sup>）計算式 DuBois式  
有効開始日 2022/ 1/28 有効終了日

承認区分  
承認日時 2022/ 1/28 12:12  
承認者 森木 康之  
承認取消日時  
承認取消者  
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない  
C C r 0～ 25 mL/min %  
C C r 25～ 50 mL/min %  
C C r 50～ 75 mL/min %  
C C r 75～100 mL/min %

G F R 0～ 25 mL/min %  
G F R 25～ 50 mL/min %  
G F R 50～ 75 mL/min %  
G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 有り  
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り  
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上  
T-Bil 2mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り  
白血球  $30 \times 10^9 / \mu l$  以下 リンパ球 1% 以下  
好中球  $15 \times 10^9 / \mu l$  以下 血小板  $10 \times 10^4 / \mu l$  以下  
ヘモグロビン 8g/dl 以下

30日前までの検査結果を参照

|                                                                                                                                                      | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 注射                                                                                                                                                   |         |         |          |          |          |          |          |
| Rp 01<br>点滴注射 点滴注射<br>30分かけて<br>デキサート注射液 6. 6 mg/ 2 mL (デカトロン) 1 瓶<br>デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 1 A<br>グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋 | 00:00   |         |          |          |          |          |          |
| Rp 02<br>点滴注射 点滴注射<br>90分かけて<br>テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋<br>イリノテカン注 60 mg/m <sup>2</sup>                                                                  | 00:00   |         |          |          |          |          |          |
| Rp 06<br>点滴注射 点滴注射<br>フラッシュ用<br>大塚生食注 5 0 m L 1 瓶                                                                                                    | 00:00   |         |          |          |          |          |          |
| 続き有り                                                                                                                                                 |         |         |          |          |          |          |          |

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/4/8

18:04

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑩アクテラ① 4W

同一グループ

疾患名 神経内分泌癌 NEC（小細胞型）  
診療科 内科  
投薬日数 15日  
休薬日数 13日  
最大クール数 4クール  
心機能の確認 任意  
体表面積（m<sup>2</sup>）計算式 DuBois式  
有効開始日 2022/ 1/28 有効終了日

承認区分  
承認日時 2022/ 1/28 12:12  
承認者 森木 康之  
承認取消日時  
承認取消者  
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

|       |        |        |   |       |        |        |   |
|-------|--------|--------|---|-------|--------|--------|---|
| C C r | 0～ 25  | mL/min | % | G F R | 0～ 25  | mL/min | % |
| C C r | 25～ 50 | mL/min | % | G F R | 25～ 50 | mL/min | % |
| C C r | 50～ 75 | mL/min | % | G F R | 50～ 75 | mL/min | % |
| C C r | 75～100 | mL/min | % | G F R | 75～100 | mL/min | % |

腎機能の検査結果値による警告 有り  
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り  
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上  
T-Bil 2mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り  
白血球  $30 \times 10^9 / \mu l$  以下 リンパ球 1% 以下  
好中球  $15 \times 10^9 / \mu l$  以下 血小板  $10 \times 10^4 / \mu l$  以下  
ヘモグロビン 8g/dl 以下

30日前までの検査結果を参照

|                                                                                                                                                  | day (15) |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 注射                                                                                                                                               |          |  |  |  |  |  |  |
| Rp 01<br>点滴注射 点滴注射<br>30分かけて<br>デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶<br>デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A<br>グラネセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋 | 00:00    |  |  |  |  |  |  |
| Rp 02<br>点滴注射 点滴注射<br>90分かけて<br>テルモ生食 500mL 1 袋<br>イリノテカン注 60 mg/m <sup>2</sup>                                                                  | 00:00    |  |  |  |  |  |  |
| Rp 06<br>点滴注射 点滴注射<br>フラッシュ用<br>大塚生食注 50mL 1 瓶                                                                                                   | 00:00    |  |  |  |  |  |  |
| ー以下余白ー                                                                                                                                           |          |  |  |  |  |  |  |

コメント

参考文献