

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/1/16 15:06

プロトコール名称 サイラムザ[®]①ドセタキセル① 3W

同一グループ

疾患名	肺/非小細胞癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/11/27 13:49
投薬日数	1日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/11/27	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 25mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^4 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^4 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠10mg サイラムザ投与30分前に内服 ... 1日1回	○						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 30分かけて デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 2 A グラセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴注射 サイラムザ前後でフラッシュ 2クール目までは観察時使用 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 1時間かけて 最初の2サイクルは投与後 1時間の観察期間が必要 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 サイラムザ点滴静注液 10 mg/kg	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 90分かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 60 mg/m ²	00:00						
Rp 05 点滴注射 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						
—以下余白—							

コメント

参考文献