

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/1/16 15:07

プロトコール名称 パクリタセル①⑧⑬パラプラチン①4W TC

同一グループ

疾患名	肺/非小細胞癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 13:28
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	6クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 25mg/dl	以上	S c r 1. 5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 54IU/l	以上	A L T 66IU/l	以上
T-Bil 1. 5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7. 5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 パクリタキセル投与30分前に内服 ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 30分かけて デキサート注射液 6． 6 mg/ 2 mL (デ [®] カ [®] ト [®] ロン) 1 瓶 デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デ [®] カ [®] ト [®] ロン) 1 A グ [®] ラ [®] セ [®] ト [®] ロン点滴静注 [®] バック [®] 1mg/50mL「HK」(カイト [®] リル) 1 袋	00:00						
注射							
Rp 03 静脈内注射 静脈内注射 レスタミン服用 30分あけて パ [®] ク [®] リ [®] タ [®] キ [®] セル投与 大塚生食注 2 0 m L 1 A ガスター注射液 2 0 m g 2 m L 1 A	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 30分かけて 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 05 点滴注射 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 パクリタキセル注 70 mg/m ² (70～80mg/m ²)	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/1/16 15:07

プロトコール名称 パクリタセル①⑧⑬パラプラチン④W TC

同一グループ

疾患名	肺/非小細胞癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 13:28
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	6クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 25mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 54IU/l	以上	A L T 66IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 06 点滴注射 2時間かけて テルモ生食500mL パラプラチン注 (AUC5～6)	00:00						
Rp 07 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/1/16 15:07

プロトコール名称 パクリタセル①⑧⑬パラプラチン①4W TC

同一グループ

疾患名	肺/非小細胞癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 13:28
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	6クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 25mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 54IU/l	以上	A L T 66IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方（前投薬） 院内							
Rp 02 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 パクリタキセル投与30分前に内服 ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 02 点滴注射 点滴注射 30分かけて パクリ単独時は減量可 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 4 A グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 03 静脈内注射 静脈内注射 レスタミン服用 30分あけて パクリタキセル投与 大塚生食注 2 0 m L 1 A ガスター注射液 2 0 m g 2 m L 1 A	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 30分かけて 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 05 点滴注射 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 パクリタキセル注 70 mg/m ² (70～80mg/m ²)	00:00						
Rp 08 点滴注射 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/1/16 15:07

プロトコール名称 パクリタセル①⑧⑬パプラチン①4W TC

同一グループ

疾患名	肺/非小細胞癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 13:28
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	6クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 25mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 54IU/l	以上	A L T 66IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 03 レスタミンコーワ錠 10mg 5 錠 パクリタキセル投与30分前に内服 ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 02 点滴注射 点滴注射 30分かけて パクリ単独時は減量可 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 4 A グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 03 静脈内注射 静脈内注射 レスタミン服用 30分あけて パクリタキセル投与 大塚生食注 20mL 1 A ガスター注射液 20mg 2mL 1 A	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 30分かけて 大塚生食注 50mL 1 瓶	00:00						
Rp 05 点滴注射 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 1 袋 パクリタキセル注 70 mg/m ² (70～80mg/m ²)	00:00						
Rp 08 点滴注射 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL 1 瓶	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献