

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2021/12/14 17:57

プロトコール名称 TS-1①～21シスプラチン⑧(24h) 5W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2021/11/26 09:42
投薬日数	14日	承認者	森木 康之
休薬日数	14日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/11/26	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 0.8mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL	00:00 点滴注射 シスプラチンまでに投与終了 1 袋						
Rp 02 点滴注射 30分かけて TS-1 80mg/m ² 3W投 2W休 デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 2 A グラネセトン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00 点滴注射 TS-1併用レジメンです すでにTS-1 7日間服用済みです						
Rp 03 点滴注射 Day 8の投与 テルモ生食500mL シスプラチン注	00:00 点滴注射 24時間かけて 1 袋 60 mg/m ²						
Rp 04 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL	00:00 点滴注射 側管からシスプラチンとの同時投与 1 袋						
Rp 05 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL	00:00 点滴注射 側管からシスプラチンとの同時投与 1 袋						
Rp 06 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL	00:00 点滴注射 1 袋						
	続き有り						

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2021/12/14 17:57

プロトコール名称 TS-1①～21シスプラチン⑧(24h) 5W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2021/11/26 09:42
投薬日数	14日	承認者	森木 康之
休薬日数	14日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/11/26	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r	0.8mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T	82.5IU/l 以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1% 以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07 点滴注射 シスプラチン投与終了後に使用 大塚生食注50mL	00:00						
点滴注射 1 瓶 ー以下余白ー							

コメント

参考文献