

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/4/8

17:52

プロトコール名称 mFOLF0X6+オブジーボ 2W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2022/ 1/28 12:10
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 1/28	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋 皮下埋込型一般注射液	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 オブジーボ前後のフラッシュ 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶 皮下埋込型一般注射液	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 30分以上かけて 終了後30分以上空けてエルブラット開 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 オブジーボ点滴静注 240 mg/Body 【冷&暗保存】 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 インラインフィルター使用	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 レボホリナート注 200 mg/ m ² 皮下埋込型一般注射液	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 エルブラット注 85 mg/ m ² 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 LVと同時投与	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/8

17:52

プロトコール名称 mFOLFOX6+オプジーボ 2W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2022/ 1/28 12:10
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 1/28	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
Rp 06 中心静脈注射 全開 大塚生食注50mL 5-FU注 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 瓶 400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00						
Rp 07 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL 皮下埋込型一般注射液 1 瓶	00:00						
Rp 08 中心静脈注射 46時間かけて 大塚生食注50mL 抗凝)ヘパリンNa注5千単位/5mL「ネパダ」 5-FU注 (2400～3000mg/m ²) 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 ml 1 ml 2400 mg/m ² 【冷所保存】 ー以下余白ー	00:00						

コメント

参考文献