

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2021/12/14 17:57

プロトコール名称 ゼーラダ®①~⑭シスプラチン①XP+Her①3W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 13:45
投薬日数	14 日	承認者	森木 康之
休薬日数	7 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0~ 25 mL/min	%	G F R 0~ 25 mL/min	%
C C r 25~ 50 mL/min	%	G F R 25~ 50 mL/min	%
C C r 50~ 75 mL/min	%	G F R 50~ 75 mL/min	%
C C r 75~100 mL/min	%	G F R 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 ハーセプチン投与30分前に内服 後)ロキソプロフェンNa錠60mg「サリイ」(ロキソニン) 1 錠 ．． 1日1回	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 30分かけて ゼーラダ®併用レジメンです ゼーラダ® 2000mg/m ² 2W投 1W休 デキサート注射液 6． 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0. 5mL) (デカトロン) 2 A グラネセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴注射 ハーセプチン前後のフラッシュ シスプラチンまでに投与終了 テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 90分かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 ハーセプチン注 6 mg/kg 初回は8mg/kg/90分 2回目以降短縮可 【冷&暗保存】	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 2時間かけて テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋 シスプラチン注 80 mg/m ² 80mg/m ² は離脱症例多く減量検討下さい	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2021/12/14 17:57

プロトコール名称 ゼロータ①~⑭スプラチン①XP+Her①3W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 13:45
投薬日数	14日	承認者	森木 康之
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0~ 25 mL/min	%	G F R 0~ 25 mL/min	%
C C r 25~ 50 mL/min	%	G F R 25~ 50 mL/min	%
C C r 50~ 75 mL/min	%	G F R 50~ 75 mL/min	%
C C r 75~100 mL/min	%	G F R 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 05 点滴注射 CDDPの側管から投与 テルモ生食500mL 点滴注射 1 袋	00:00						
Rp 06 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL 点滴注射 1 袋	00:00						
Rp 07 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL 点滴注射 1 袋	00:00						
—以下余白—							

コメント

参考文献