

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2023/8/2

10:30

プロトコール名称 ガザイバ①-CVP 2~8クール 3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
 診療科 内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 7クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2023/ 6/22 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2023/ 6/30 09:05
 承認者 森木 康之
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 100mg/dl	以上	Scr	2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 135IU/l	以上	ALT	165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠 カロナール錠 200mg 5錠 ... 1日1回 ガザイバ開始の30~60分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 主管 ルート確保、フラッシュ、経過 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1袋	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴注射 day1はガザイバの60分前にPSL内服 30分かけて PSL 100mg/body 5日間併用 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1袋	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 注入速度徐々にup、降圧剤中止考慮 リンパ球 ↓ ST合剤考慮 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 210 mL 全量250mL、フィルター使用 ガザイバ点滴静注 1000mg / 40mL 1000 mg/Body 投与後30分経過観察 【冷&暗保存】	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 2時間かけて テルモ生食 500mL 1袋 エンドキサン注 750 mg/m ²	00:00						

コメント

参考文献

