プロトコールマスター内容

発行日時 2023/7/31 16:12

プロトコール名称 FOLFOX4+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(隔週) 2W

同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 内科
投薬日数 2日
休薬日数 12日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/11/ 9 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/11/ 9 15:49
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 mL/min	%		ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%	
ＣＣｒ 25～ 50 mL/min	%		ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%	
ＣＣｒ 50～ 75 mL/min	%		ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%	
ＣＣｒ 75～100 mL/min	%		ＧＦＲ 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 有り

ＢＵＮ	20mg/dl	以上	Ｓｃｒ	1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

ＡＳＴ	67.5IU/l	以上	ＡＬＴ	82.5IU/l	以上
T-Bil	1.5mg/dl	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 有り

白血球	30×10^2/μl	以下	リンパ球	1%	以下
好中球	15×10^2/μl	以下	血小板	7.5×10^4/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	8g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day(1)	day(2)					
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 5 錠 アービタックス投与30分前に内服 ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液６．６mg/２mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」(ｶｲﾄﾘﾙ) 1 袋	00:00						
注射							
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」(ｶｲﾄﾘﾙ) 1 袋		00:00					
注射							
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注１００ｍＬ 1 瓶	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 2時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」２５０ｍＬ 1 袋 Cmabが210mL以上の時のみ アービタックス注射液１００ｍｇ２０ｍＬ 500 mg/㎡ 入りきらないので生食抜いて調製する	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

発行日時 2023/7/31 16:12

プロトコール名称 FOLFOX4+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(隔週) 2W

同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 内科
投薬日数 2日
休薬日数 12日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/11/ 9 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/11/ 9 15:49
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 mL/min	%		ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%	
ＣＣｒ 25～ 50 mL/min	%		ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%	
ＣＣｒ 50～ 75 mL/min	%		ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%	
ＣＣｒ 75～100 mL/min	%		ＧＦＲ 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 有り

ＢＵＮ	20mg/dl	以上	Ｓｃｒ	1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

ＡＳＴ	67.5IU/l	以上	ＡＬＴ	82.5IU/l	以上
T-Bil	1.5mg/dl	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 有り

白血球	30×10^2/μl	以下	リンパ球	1%	以下
好中球	15×10^2/μl	以下	血小板	7.5×10^4/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	8g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day(1)	day(2)					
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 フラッシュのみアービタックスと 同じ投与速度 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」２５０ｍＬ 1 袋	00:00						
注射							
Rp 06 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 2時間かけて 大塚糖液５％２５０ｍＬ 1 袋 レボホリナート注 100 mg/㎡	00:00	00:00					
注射							
Rp 07 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 2時間かけて LVと同時投与 大塚糖液５％２５０ｍＬ 1 袋 エルプラット注 85 mg/㎡	00:00						
注射							
Rp 08 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 全開 大塚生食注５０ｍＬ 1 瓶 ５－ＦＵ注 400 mg/㎡ 【冷所保存】	00:00	00:00					
Rp 09 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 22時間かけて テルモ生食５００ｍＬ 1 袋 ５－ＦＵ注 600 mg/㎡ 【冷所保存】	00:00	00:00					
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

発行日時 2023/7/31 16:12

プロトコール名称 FOLFOX4+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(隔週) 2W

同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 内科
投薬日数 2日
休薬日数 12日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/11/ 9 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/11/ 9 15:49
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 mL/min	%		ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%	
ＣＣｒ 25～ 50 mL/min	%		ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%	
ＣＣｒ 50～ 75 mL/min	%		ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%	
ＣＣｒ 75～100 mL/min	%		ＧＦＲ 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 有り

ＢＵＮ	20mg/dl	以上	Ｓｃｒ	1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

ＡＳＴ	67.5IU/l	以上	ＡＬＴ	82.5IU/l	以上
T-Bil	1.5mg/dl	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 有り

白血球	30×10^2/μl	以下	リンパ球	1%	以下
好中球	15×10^2/μl	以下	血小板	7.5×10^4/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	8g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day(1)	day(2)					
Rp 10		00:00					
中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液							
フラッシュ用							
大塚生食注５０ｍＬ 1 瓶							
ー以下余白ー							

コメント

参考文献