

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2023/7/31 16:31

プロトコール名称 LV5FU2(de Gramont)+Cmab(隔週) 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2022/11/10 11:05
投薬日数	2日	承認者	森木 康之
休薬日数	12日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/11/10	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)					
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠 ... 1日1回 アービタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6.6mg/2mL (デカトロン) 1瓶 グレセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1袋	00:00						
注射							
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1A グレセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1袋		00:00					
注射							
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注 100mL 1瓶	00:00						
注射							
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 2時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 1袋 Cmabが210mL以上の時のみ アービタックス注射液 100mg 20mL 500mg/m ² 入りきらないので生食抜いて調製する	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2023/7/31 16:31

プロトコール名称 LV5FU2 (de Gramont) +Cmab (隔週) 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2022/11/10 11:05
投薬日数	2日	承認者	森木 康之
休薬日数	12日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/11/10	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)					
Rp 05 中心静脈注射 1時間かけて 皮下埋込型一般注射液 アービタックスと同じ投与速度でフラ 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋	00:00						
注射							
Rp 06 中心静脈注射 2時間かけて 皮下埋込型一般注射液 大塚糖液5%250mL 1 袋 レボホリナート注 100 mg/m ²	00:00	00:00					
Rp 07 中心静脈注射 全開 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 大塚生食注50mL 1 瓶 5-FU注 400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00	00:00					
Rp 08 中心静脈注射 22時間かけて 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 テルモ生食500mL 1 袋 5-FU注 600 mg/m ² 【冷所保存】	00:00	00:00					
Rp 09 中心静脈注射 フラッシュ用 皮下埋込型一般注射液 大塚生食注50mL 1 瓶		00:00					
ー以下余白ー							

コメント

参考文献