

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2023/7/31 16:30

プロトコール名称 mFOLF0X6+アービタックス(隔週) 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2022/11/10 11:06
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/11/10	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day(1)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠10mg ．．1日1回 アービタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液6．6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 1 A グラセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 2時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 Cmabが210mL以上の時のみ アービタックス注射液100mg20mL 500 mg/m ² 入りきらないので生食抜いて調製する	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 1時間かけて アービタックスと同じ投与速度でフラ 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 2時間かけて 大塚糖液5%250mL 1 袋 レボホリナート注 200 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2023/7/31 16:30

プロトコール名称 mFOLF0X6+アビドックス(隔週) 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2022/11/10 11:06
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/11/10	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8 g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
Rp 06 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L エルプラット注	皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 LVと同時投与 1 袋 85 mg/m ²	00:00					
Rp 07 中心静脈注射 全開 大塚生食注 5 0 m L 5 - F U 注	皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1 瓶 400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00					
Rp 08 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L	皮下埋込型一般注射液 1 瓶	00:00					
Rp 09 中心静脈注射 46時間かけて 大塚生食注 5 0 m L 抗凝) ヘパリン N a 注 5 千単位 / 5mL「モチダ」 5 - F U 注 (2400～3000mg/m2)	皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1 mL 1 mL 2400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00					
ー以下余白ー							

コメント

参考文献