

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2023/8/2

10:31

プロトコール名称 mFOLFOXIRI+アパスタシ 2W

同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 内科
投薬日数 1日
休薬日数 13日
最大クール数 12クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2023/ 6/26

承認区分
承認日時 2023/ 6/30 09:21
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9 g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 高度催吐リスクレジメンです パロノセトロン、イメンド考慮くださ 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2 mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 1 A グテネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 ベバシズマブ前後のフラッシュ 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 90分かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 ベバシズマブ注 5 mg/kg 【冷&暗保存】	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 90分かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 イリノテカン注 150 mg/m ²	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 レボホリナート注 200 mg/m ²	00:00						
Rp 06 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 2時間かけて LVと同時に投与 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 オキサリプラチン注 85 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2023/8/2

10:31

プロトコール名称 mFOLFOXIRI+アパースチン 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2023/ 6/30 09:21
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	12クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2023/ 6/26	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9 g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
Rp 07 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL	皮下埋込型一般注射液 1 瓶	00:00					
Rp 08 中心静脈注射 46時間かけて 大塚生食注50mL 抗凝)ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 5-FU注 (2400～3000mg/m ²)	皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 1 mL 1 mL 2400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00					
ー以下余白ー							

コメント

参考文献