

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2023/8/2

10:29

プロトコール名称 ガザイバ①⑧⑮-CVP 初回3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 6日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2023/ 6/22 有効終了日

承認区分
承認日時 2023/ 6/30 09:06
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0 ~ 25	mL/min	%	G F R	0 ~ 25	mL/min	%
C C r	25 ~ 50	mL/min	%	G F R	25 ~ 50	mL/min	%
C C r	50 ~ 75	mL/min	%	G F R	50 ~ 75	mL/min	%
C C r	75 ~ 100	mL/min	%	G F R	75 ~ 100	mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 1.5mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 67.5IU/l 以上 A L T 82.5IU/l 以上
T-Bil 1.5mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 9 g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 10mg 5 錠 カロナール錠 200mg 5 錠 ... 1日1回 ガザイバ開始の30~60分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 主管 ルート確保、フラッシュ、経過 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 day1はガザイバの60分前にPSL内服 30分かけて PSL 100mg/body day1~5併用 グラセプトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
注射							
Rp 05 点滴注射 点滴注射 注入速度徐々にup、降圧剤中止考慮 リンパ球↓ST合剤考慮 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 210 mL 全量250mL、フィルター使用 ガザイバ点滴静注 1000mg / 40mL 1000 mg/Body 投与後30分経過観察 【冷&暗保存】	00:00						
注射							
Rp 06 点滴注射 点滴注射 2時間かけて テルモ生食 500mL 1 袋 エンドキサン注 750 mg/m ²	00:00						

続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2023/8/2

10:29

プロトコール名称 ガザイバ①⑧⑮-CVP 初回3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 6日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2023/ 6/22 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2023/ 6/30 09:06
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0~ 25 mL/min	%	G F R 0~ 25 mL/min	%
C C r 25~ 50 mL/min	%	G F R 25~ 50 mL/min	%
C C r 50~ 75 mL/min	%	G F R 50~ 75 mL/min	%
C C r 75~100 mL/min	%	G F R 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 1. 5mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 67. 5IU/l 以上 A L T 82. 5IU/l 以上
T-Bil 1. 5mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$ 以下 血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 9 g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07 静脈内注射 ゆっくりと 大塚生食注 2 0 m L オンコビン注射用 1 m g MAX 2mg/Body	00:00						
静脈内注射 1 A 1. 4 mg/m ²							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2023/8/2

10:29

プロトコール名称 ガザイバ①⑧⑮-CVP 初回3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 6日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2023/ 6/22 有効終了日

承認区分
承認日時 2023/ 6/30 09:06
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 1.5mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 67.5IU/l 以上 A L T 82.5IU/l 以上
T-Bil 1.5mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り
白血球 $30 \times 10^2 / \mu\text{l}$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu\text{l}$ 以下 血小板 $10 \times 10^4 / \mu\text{l}$ 以下
ヘモグロビン 9 g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方 (前投薬) 院内							
Rp 02 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 カロナール錠200mg 5錠 ... 1日1回 ガザイバ開始の30～60分前に内服	○						
注射							
Rp 02 点滴注射 点滴注射 主管 ルート確保、フラッシュ用 大塚生食注100mL 1瓶	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 ガザイバ開始の60分前には終了 30分かけて 大塚生食注50mL 1瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 3瓶	00:00						
Rp 05 点滴注射 点滴注射 注入速度徐々にup、降圧剤中止考慮 リンパ球↓ST合剤考慮 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 210mL 全量250mL、フィルター使用 ガザイバ点滴静注1000mg/40mL 1000mg/Body 投与後30分経過観察 【冷&暗保存】	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2023/8/2

10:29

プロトコール名称 ガザイバ①⑧⑮-CVP 初回3W

同一グループ

疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 1クール

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2023/ 6/22

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2023/ 6/30 09:06

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

1. 5mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 67. 5IU/l

以上

A L T

82. 5IU/l

以上

T-Bil 1. 5mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

$10 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 9 g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 03 レスタミンコーワ錠1 0 m g 5 錠 カロナール錠2 0 0 m g 5 錠 ．． 1日1回 ガザイバ開始の30～60分前に内服	○						
注射							
Rp 02 点滴注射 点滴注射 主管 ルート確保、フラッシュ用 大塚生食注1 0 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 04 点滴注射 点滴注射 ガザイバ開始の60分前には終了 30分かけて 大塚生食注5 0 m L 1 瓶 デキサート注射液6． 6 mg/ 2 mL (デカトロン) 3 瓶	00:00						
Rp 05 点滴注射 点滴注射 注入速度徐々にup、降圧剤中止考慮 リンパ球↓ST合剤考慮 生理食塩液バッグ「フソー」2 5 0 m L 210 mL 全量250mL、フィルター使用 ガザイバ点滴静注1 0 0 0 m g / 4 0 m L 1000 mg/Body 投与後30分経過観察 【冷&暗保存】	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献