

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2023/8/2

10:29

プロトコール名称 ★ゲムシタビン①⑧カルボプラチン①⑧ 3W (ICI併用)

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2023/ 6/ 2 11:17
投薬日数	8日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2023/ 5/25	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9 g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 ルート確保、フラッシュ用 大塚生食注100mL	00:00 皮下埋込型一般注射液 1 瓶						
Rp 02 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液6. 6mg/2mL(デカトロン) デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) パロシトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイパ」	00:00 皮下埋込型一般注射液 ICIは前投薬終了後化学療法剤前に使 1 瓶 1 A 1 袋						
Rp 03 中心静脈注射 30分かけて 大塚生食注100mL ジェムザール注	00:00 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 瓶 1000 mg/m ²						
Rp 04 中心静脈注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL パラプラチン注	00:00 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 袋 2 AUC						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2023/8/2

10:29

プロトコール名称 ★ゲムシタビン①⑧カルボプラチン①⑧ 3W (ICI併用)

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2023/ 6/ 2 11:17
投薬日数	8日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2023/ 5/25	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9 g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (8)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 ルート確保、フラッシュ用 大塚生食注100mL	皮下埋込型一般注射液 1 瓶	00:00					
Rp 02 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液6. 6 mg/ 2 mL(デカトロン) デキサート注射液1. 65mg(0. 5mL)(デカトロン) パロシトロン点滴静注バッグ0. 75mg/50mL「タイパ」	皮下埋込型一般注射液 ICIは前投薬終了後化学療法剤前に使 1 瓶 1 A 1 袋	00:00					
Rp 03 中心静脈注射 30分かけて 大塚生食注100mL ジェムザール注	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 瓶 1000 mg/m ²	00:00					
Rp 04 中心静脈注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL パラプラチン注	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 袋 2 AUC	00:00					
ー以下余白ー							

コメント

参考文献