

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2023/8/2

10:32

プロトコール名称 アービタックス(隔週) ①⑮ 4W

同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2023/ 6/30

有効終了日

承認区分
承認日時 2023/ 6/30 09:22
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上
T-Bil 3mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8 g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 ．． 1日1回 アービタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて 初回はデキサート量注意 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デ ^キ カ ^ト ロン) 2 A	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 2時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 Cmabが210mL以上の時のみ アービタックス注射液 1 0 0 m g 2 0 m L 500 mg/m ² 入りきらないので生食抜いて調製する	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 1時間かけて アービタックスと同じ投与速度でフラ 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2023/8/2

10:32

プロトコール名称 アービタックス(隔週) ①⑮ 4W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2023/ 6/30 09:22
投薬日数	15 日	承認者	森木 康之
休薬日数	13 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2023/ 6/30	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8 g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (15)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 02 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 ．． 1日1回 アービタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて 初回はデキサート量注意 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デ ^キ カ ^ト ロン) 2 A	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 2時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 Cmabが210mL以上の時のみ アービタックス注射液 1 0 0 m g 2 0 m L 500 mg/m ² 入りきらないので生食抜いて調製する	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 1時間かけて アービタックスと同じ投与速度でフラ 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献