

プロトコールマスター内容

1 / 5

発行日時 2023/8/2

10:32

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬+アビタックス(隔週)①⑬4W

同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2023/ 6/30

有効終了日

承認区分
承認日時 2023/ 6/30 09:22
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0 ~ 25	mL/min	%	G F R	0 ~ 25	mL/min	%
C C r	25 ~ 50	mL/min	%	G F R	25 ~ 50	mL/min	%
C C r	50 ~ 75	mL/min	%	G F R	50 ~ 75	mL/min	%
C C r	75 ~ 100	mL/min	%	G F R	75 ~ 100	mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬) 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 10mg ... 1日1回 アビタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6.6mg/2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注 100mL 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 2時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 1 袋 Cmabが210mL以上の時のみ アビタックス注射液 100mg 20mL 500 mg/m ² 入りきらないので生食抜いて調製する	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 1時間かけて アビタックスと同じ投与速度でフラ 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 1 袋	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 90分かけて テルモ生食 500mL 1 袋 イリノテカン注 100 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容								2 / 5		
発行日時 2023/8/2								10:32		
プロトコール名称 イリナカン①⑧⑬+ア-ビ`タックス(隔週)①⑬4W										
同一グループ										
疾患名 大腸癌 診療科 内科 投薬日数 15日 休薬日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2023/ 6/30				承認区分 承認済 承認日時 2023/ 6/30 09:22 承認者 森木 康之 承認取消日時 承認取消者 更新者 森木 康之						
有効終了日										
腎機能の値による実投与量の割合 かけない										
C C r 0~ 25 mL/min		%		G F R 0~ 25 mL/min		%				
C C r 25~ 50 mL/min		%		G F R 25~ 50 mL/min		%				
C C r 50~ 75 mL/min		%		G F R 50~ 75 mL/min		%				
C C r 75~100 mL/min		%		G F R 75~100 mL/min		%				
腎機能の検査結果値による警告 有り										
B U N 100mg/dl		以上		S c r		2.4mg/dl		以上		
肝機能の検査結果値による警告 有り										
A S T 135IU/l		以上		A L T		165IU/l		以上		
T-Bil 2mg/dl		以上								
C B Cの検査結果値による警告 有り										
白血球 30 × 10 ² /μ l		以下		リンパ球		1%		以下		
好中球 15 × 10 ² /μ l		以下		血小板		10 × 10 ⁴ /μ l		以下		
ヘモグロビン 8 g/dL		以下								
30日前までの検査結果を参照										
				day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL				皮下埋込型一般注射液	1	瓶	00:00			
				続き有り						
コメント										
参考文献										

プロトコールマスター内容

3 / 5

発行日時 2023/8/2

10:32

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬+アークタックス(隔週)①⑬4W

同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2023/ 6/30

有効終了日

承認区分
承認日時 2023/ 6/30 09:22
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0 ~ 25	mL/min	%	G F R	0 ~ 25	mL/min	%
C C r	25 ~ 50	mL/min	%	G F R	25 ~ 50	mL/min	%
C C r	50 ~ 75	mL/min	%	G F R	50 ~ 75	mL/min	%
C C r	75 ~ 100	mL/min	%	G F R	75 ~ 100	mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl 以上

C B C の検査結果値による警告 有り
白血球 $30 \times 10^4 / \mu\text{l}$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $15 \times 10^4 / \mu\text{l}$ 以下 血小板 $10 \times 10^4 / \mu\text{l}$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6 . 6 mg/ 2 mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 1 A グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 90分かけて テルモ生食 5 0 0 mL 1 袋 イリノテカン注 100 mg/m ²	00:00						
Rp 06 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 mL 1 瓶	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 5

発行日時 2023/8/2

10:32

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬+アビタックス(隔週)①⑬4W

同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2023/ 6/30

承認区分
承認日時 2023/ 6/30 09:22
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r	2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T	165IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球	1% 以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板	$10 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8 g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
処方 (前投薬) 院内							
Rp 02 レスタミンコーワ錠 10mg ... 1日1回 アビタックス投与30分前に内服	朝						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて デキサート注射液 6.6mg/2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グレースロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 レスタミン服用 30分かけて 大塚生食注 100mL 1 瓶	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 2時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 1 袋 Cmabが210mL以上の時のみ アビタックス注射液 100mg 20mL 500 mg/m ² 入りきらないので生食抜いて調製する	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 1時間かけて アビタックスと同じ投与速度でフラ 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 1 袋	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 90分かけて テルモ生食 500mL 1 袋 イリノテカン注 100 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 5

発行日時 2023/8/2

10:32

プロトコール名称 イリナカン①⑧⑬+ア-ビタックス(隔週)①⑬4W

同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2023/ 6/30

承認区分
承認日時 2023/ 6/30 09:22
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%	
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%	
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%	
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
B U N 100mg/dl	以上	S c r	2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
A S T 135IU/l	以上	A L T	165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上			

C B Cの検査結果値による警告	有り			
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

Rp 06
中心静脈注射
フラッシュ用
大塚生食注50mL

皮下埋込型一般注射液
1 瓶

ー以下余白ー

コメント

参考文献