

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2023/8/2

10:23

プロトコール名称 ★エピルビシン①エンドキサン①dd-EC90 2W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2023/ 2/17 09:04
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	6クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2023/ 2/17	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 主管です。ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注100mL	皮下埋込型一般注射液 1 瓶	00:00					
Rp 02 中心静脈注射 イマト3日間、翌日以降ゾナックス2T/5日間マゲミット適量7日間、プロテカゾン2T/7日間 30分かけて デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 翌日以降デカトロン4mg5日間内服 デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) パロヒトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイタ」	皮下埋込型一般注射液 側管① 2 A 1 瓶 1 袋	00:00					
Rp 03 中心静脈注射 15分かけて 大塚生食注100mL 70mL抜いて下さい エピルビシン塩酸塩注射液	皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 側管② 30 mL 90 mg/m ² 【冷所保存】	00:00					
Rp 04 中心静脈注射 30分かけて 大塚生食注100mL エンドキサン注	皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 側管③ 1 瓶 600 mg/m ²	00:00					
ー以下余白ー							

コメント

参考文献