

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2024/6/3

11:31

プロトコール名称 ★ドセタキセル①⑤フルツロン①～28 4W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2023/12/22 14:40
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2023/12/22	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $40 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 $1 \times 10^4 / \mu l$	以下
好中球 $20 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 主管です。ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて 側管① フルツロン600mg/body(分3) 連日投与 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 2 A (10～20mgで使用) デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 グアナセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 90分かけて 側管② 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 ド)ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 40 mg/m ²	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2024/6/3

11:31

プロトコール名称 ★ドセタキセル①⑤フルツロン①～28 4W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2023/12/22 14:40
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2023/12/22	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $40 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 $1 \times 10^4 / \mu l$	以下
好中球 $20 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 主管です。ルート確保とフラッシュ用 大塚生食注100mL 1 瓶	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 皮下埋込型一般注射液 30分かけて 側管① フルツロン600mg/body(分3) 連日投与 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 2 A (10～20mgで使用) デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 グレーストロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 90分かけて 側管② 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 ド)ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 40 mg/m ²	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献