

プロトコールマスター内容								1 / 7	
発行日時 2025/4/17 15:23									
プロトコール名称 Isa-Kd ①②⑧⑨⑮⑯⑳23 4W 導入									
同一グループ									
疾患名 造血器/多発性骨髄腫 診療科 内科 投薬日数 22日 休薬日数 6日 最大クール数 1クール 心機能の確認 必須 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2025/ 2/28					承認区分 承認日時 2025/ 2/28 11:24 承認者 森木 康之 承認取消日時 承認取消者 更新者 森木 康之				
有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない									
C C r 0～ 25 mL/min % G F R 0～ 25 mL/min %									
C C r 25～ 50 mL/min % G F R 25～ 50 mL/min %									
C C r 50～ 75 mL/min % G F R 50～ 75 mL/min %									
C C r 75～100 mL/min % G F R 75～100 mL/min %									
腎機能の検査結果値による警告 有り									
B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上									
肝機能の検査結果値による警告 有り									
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上									
T-Bil 3mg/dl 以上									
C B Cの検査結果値による警告 有り									
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下									
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$ 以下									
ヘモグロビン 6.5 g/dL 以下									
30日前までの検査結果を参照									
day (1) day (2) day (3) day (4) day (5) day (6) day (7)									
処方 (前投薬) 院内									
Rp 01									
レスタミンコーワ錠10mg 5錠									
カロナール錠200mg 2錠									
ファモチジンD錠20mg「EMEC」(ガスター) 1錠									
K◆レナデックス錠4mg 5錠									
... 1日1回									
サークリサ開始60～15分前に内服									
Rp 02									
K◆レナデックス錠4mg 5錠									
... 1日1回									
カイプロリス開始4時間～30分前に内服									
注射									
Rp 01									
点滴注射 点滴注射									
ルート確保とフラッシュ用									
大塚糖液5%100mL 1瓶									
Rp 02									
点滴注射 点滴注射									
徐々に速度アップ インラインフィルター使用									
総量250mLとなるよう希釈									
大塚糖液5%250mL 1袋									
サークリサ点滴静注 10mg/kg									
【冷所保存】									
続き有り									
コメント									
参考文献									

プロトコールマスター内容

2 / 7

発行日時 2025/4/17 15:23

プロトコール名称 Isa-Kd ①②⑧⑨⑮⑯⑳23 4W 導入

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22 日

休薬日数 6 日

最大クール数 1クール

心機能の確認 必須

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2025/ 2/28

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2025/ 2/28 11:24

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 135IU/l

以上

A L T

165IU/l

以上

T-Bil 3mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

$5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 6.5 g/dL

以下

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 03 点滴注射 10mgあたり蒸留水5mLで溶解 30分かけて カイプロリス点滴静注用 BSA2.2m ² 以上は2.2m ² で計算 大塚蒸留水 2 0 m L 大塚糖液 5 % 1 0 0 m L	00:00	00:00					
点滴注射 インラインフィルター使用 20 mg/m ² 【冷所保存】 1 A 1 瓶							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 7

発行日時 2025/4/17 15:23

プロトコール名称 Isa-Kd ①②⑧⑨⑮⑯⑳23 4W 導入

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 1クール

心機能の確認 必須

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2025/ 2/28

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2025/ 2/28 11:24

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 135IU/l

以上

A L T

165IU/l

以上

T-Bil 3mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$

以下

血小板

 $5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 6.5g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方 (前投薬) 院内							
Rp 03 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 カロナール錠200mg 2錠 ファモチジンD錠20mg「EMEC」(ガスター) 1錠 K◆レナデックス錠4mg 5錠 ．．1日1回 サークリサ開始60～15分前に内服	朝						
Rp 04 K◆レナデックス錠4mg 5錠 ．．1日1回 カイプロリス開始4時間～30分前に内服		○					
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 ルート確保とフラッシュ用 大塚糖液5%100mL 1瓶	00:00	00:00					
Rp 02 点滴注射 点滴注射 徐々に速度アップ インラインフィルター使用 総量250mLとなるよう希釈 大塚糖液5%250mL 1袋 サークリサ点滴静注 10mg/kg 【冷所保存】	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 7

発行日時 2025/4/17 15:23

プロトコール名称 Isa-Kd ①②⑧⑨⑮⑯⑳23 4W 導入

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 1クール

心機能の確認 必須

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2025/ 2/28 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2025/ 2/28 11:24

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告 有り

B U N 100mg/dl 以上

S c r 2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

A S T 135IU/l 以上

A L T 165IU/l

以上

T-Bil 3mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り

白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$ 以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$ 以下

血小板

$5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 6.5 g/dL 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 04 点滴注射 10mLあたり蒸留水5mLで溶解 30分かけて カイプロリス点滴静注用 BSA2.2m ² 以上は2.2m ² で計算 大塚蒸留水 20 mL 大塚糖液 5% 100 mL	00:00	00:00					
点滴注射 インラインフィルター使用 56 mg/m ² 3 A 1 瓶 【冷所保存】							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 7

発行日時 2025/4/17 15:23

プロトコール名称 Isa-Kd ①②⑧⑨⑮⑯⑳㉓ 4W 導入

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 1クール

心機能の確認 必須

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2025/ 2/28

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2025/ 2/28 11:24

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 135IU/l

以上

A L T

165IU/l

以上

T-Bil 3mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 6.5 g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方 (前投薬) 院内							
Rp 05 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 カロナール錠200mg 2錠 ファモチジンD錠20mg「EMEC」(ガスター) 1錠 K◆レナデックス錠4mg 5錠 ．．1日1回 サークリサ開始60～15分前に内服	朝						
Rp 06 K◆レナデックス錠4mg 5錠 ．．1日1回 カイプロリス開始4時間～30分前に内服		○					
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 ルート確保とフラッシュ用 大塚糖液5%100mL 1瓶	00:00	00:00					
Rp 02 点滴注射 点滴注射 徐々に速度アップ インラインフィルター使用 総量250mLとなるよう希釈 大塚糖液5%250mL 1袋 サークリサ点滴静注 10mg/kg 【冷所保存】	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

6 / 7

発行日時 2025/4/17 15:23

プロトコール名称 Isa-Kd ①②⑧⑨⑮⑯⑳23 4W 導入

同一グループ

疾患名 造血器/多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 1クール

心機能の確認 必須

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2025/ 2/28

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2025/ 2/28 11:24

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 135IU/l

以上

A L T

165IU/l

以上

T-Bil 3mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

$5 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 6.5 g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射							
Rp 04 点滴注射 10mLあたり蒸留水5mLで溶解 30分かけて カイプロリス点滴静注用 BSA2.2m ² 以上は2.2m ² で計算 大塚蒸留水 20 mL 大塚糖液 5% 100 mL	00:00	00:00					
点滴注射 インラインフィルター使用 56 mg/m ² 3 A 1 瓶 【冷所保存】							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容										7 / 7						
発行日時 2025/4/17 15:23																
プロトコール名称 Isa-Kd ①②⑧⑨⑮⑯⑳23 4W 導入																
同一グループ																
疾患名 造血器/多発性骨髄腫 診療科 内科 投薬日数 22日 休薬日数 6日 最大クール数 1クール 心機能の確認 必須 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2025/ 2/28 有効終了日						承認区分 承認日時 2025/ 2/28 11:24 承認者 森木 康之 承認取消日時 承認取消者 更新者 森木 康之										
腎機能の値による実投与量の割合 かけない C C r 0～ 25 mL/min % G F R 0～ 25 mL/min % C C r 25～ 50 mL/min % G F R 25～ 50 mL/min % C C r 50～ 75 mL/min % G F R 50～ 75 mL/min % C C r 75～100 mL/min % G F R 75～100 mL/min %																
腎機能の検査結果値による警告 有り B U N 100mg/dl 以上 S c r 2.4mg/dl 以上																
肝機能の検査結果値による警告 有り A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上 T-Bil 3mg/dl 以上																
C B Cの検査結果値による警告 有り 白血球 $20 \times 10^4/\mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下 好中球 $10 \times 10^4/\mu l$ 以下 血小板 $5 \times 10^4/\mu l$ 以下 ヘモグロビン 6.5g/dL 以下																
30日前までの検査結果を参照																
										day (22)						
処方（前投薬） 院内																
Rp 07 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 カロナール錠200mg 2錠 ファモチジンD錠20mg「EMEC」(ガスター) 1錠 K◆レナデックス錠4mg 5錠 day23のレナデックス内服処方が必要です ... 1日1回 サークリサ開始60～15分前に内服										朝						
注射																
Rp 01 点滴注射 点滴注射 ルート確保とフラッシュ用 大塚糖液5%100mL 1瓶										00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴注射 徐々に速度アップ インラインフィルター使用 総量250mLとなるよう希釈 大塚糖液5%250mL 1袋 サークリサ点滴静注 10mg/kg 【冷所保存】										00:00						
ー以下余白ー																
コメント																
参考文献																