

プロトコールマスター内容								1 / 2	
発行日時 2025/4/17 15:23									
プロトコール名称 ☆トレアキシン①②+リツキシマブ⑮初回 4w R時差投与									
同一グループ									
疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫				承認区分		承認済			
診療科 内科				承認日時		2025/ 1/31 10:55			
投薬日数 15 日				承認者		森木 康之			
休薬日数 13 日				承認取消日時					
最大クール数 1クール				承認取消者					
心機能の確認 任意				更新者		森木 康之			
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式									
有効開始日 2025/ 1/28				有効終了日					
腎機能の値による実投与量の割合 かけない									
C C r 0～ 25 mL/min		%		G F R 0～ 25 mL/min		%			
C C r 25～ 50 mL/min		%		G F R 25～ 50 mL/min		%			
C C r 50～ 75 mL/min		%		G F R 50～ 75 mL/min		%			
C C r 75～100 mL/min		%		G F R 75～100 mL/min		%			
腎機能の検査結果値による警告 有り									
B U N 100mg/dl		以上		S c r		2mg/dl		以上	
肝機能の検査結果値による警告 有り									
A S T 135IU/l		以上		A L T		165IU/l		以上	
T-Bil 2mg/dl		以上							
C B Cの検査結果値による警告 有り									
白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$		以下		リンパ球		1%		以下	
好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$		以下		血小板		$7.5 \times 10^4 / \mu l$		以下	
ヘモグロビン 9 g/dL		以下							
30 日前までの検査結果を参照									
	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)		
注射									
Rp 01									
点滴注射 点滴注射				00:00		00:00			
主管 フラッシュ用、ルート確保用									
大塚生食注 5 0 m L 1 瓶									
注射									
Rp 02									
点滴注射 点滴注射				00:00		00:00			
30分かけて									
ゲテセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋									
デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 2 A									
Rp 03									
点滴注射 点滴注射				00:00		00:00			
調製後6時間以内に投与終了 調製して良いか確認すること									
10分かけて									
大塚生食注 5 0 m L 1 瓶									
トレアキシン点滴静注液 90 mg/m ²									
続き有り									
コメント									
参考文献									

プロトコールマスター内容										2 / 2							
発行日時 2025/4/17 15:23																	
プロトコール名称 ☆トレアキシン①②+リツキシマブ⑮初回 4w R時差投与																	
同一グループ																	
疾患名 造血器/悪性非ホジキンリンパ腫 診療科 内科 投薬日数 15日 休薬日数 13日 最大クール数 1クール 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2025/ 1/28 有効終了日						承認区分 承認日時 2025/ 1/31 10:55 承認者 森木 康之 承認取消日時 承認取消者 更新者 森木 康之											
腎機能の値による実投与量の割合 かけない																	
C C r 0～ 25 mL/min			%			G F R 0～ 25 mL/min			%								
C C r 25～ 50 mL/min			%			G F R 25～ 50 mL/min			%								
C C r 50～ 75 mL/min			%			G F R 50～ 75 mL/min			%								
C C r 75～100 mL/min			%			G F R 75～100 mL/min			%								
腎機能の検査結果値による警告 有り																	
B U N 100mg/dl			以上			S c r			2mg/dl 以上								
肝機能の検査結果値による警告 有り																	
A S T 135IU/l			以上			A L T			165IU/l 以上								
T-Bil 2mg/dl			以上														
C B Cの検査結果値による警告 有り																	
白血球 $20 \times 10^4/\mu l$			以下			リンパ球			1% 以下								
好中球 $10 \times 10^2/\mu l$			以下			血小板			$7.5 \times 10^4/\mu l$ 以下								
ヘモグロビン 9g/dL			以下														
30日前までの検査結果を参照																	
										day (15)							
処方 (前投薬) 院内																	
Rp 01 レスタミンコーワ錠10mg 後)ロキソプロフェンNa錠60mg「サリイ」(ロキソニン) ... 1日1回 リツキシマブ開始30分前に内服										朝							
注射																	
Rp 01 点滴注射 主管 フラッシュ用、ルート確保用 大塚生食注50mL										点滴注射 00:00							
Rp 04 点滴注射 注入速度徐々にUP、10倍希釈して下さ テルモ生食500mL リツキシマブ注										点滴注射 00:00							
-以下余白-																	
コメント																	
参考文献																	